


FRIESIA

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT



BIND II

HEFTE 2-3

KØBENHAVN 1940-1941

INDHOLD

	Side
F. H. Møller: Severin Petersen (1840—1929) i Anledning af Hundredeaaret for hans Fødsel (Severin Petersen (1840—1929). Anlässlich seines 100. Geburtstages)	139
Wolmar Nyberg: <i>Volvaria Loveiana</i> Berk. funnen i Finland. (Summary: <i>Volvaria Loveiana</i> Berk. found in Finland)	149
A. P. Skovsted: <i>Boletus pulverulentus</i> (Opat.). En ny Rørhat for Danmark. (<i>Boletus pulverulentus</i> (Opat.). Ein neuer Röhrling in Dänemark)	153
Jakob E. Lange: Bemærkelsesværdige Paddehat-Fund i de senere Aar (Summary: Notes on rare Agarics recently found in Denmark)	156
N. Fabritius Buchwald: Lidt om Hymenoforets Variation hos Poresvampe og en ny Varietet af <i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers., <i>D. q.</i> var. <i>irpiciformis</i> v. n. (Summary: On the variation of the hymenophore of <i>Polyporaceae</i> , and a new variety of <i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers., <i>D. q.</i> var. <i>irpiciformis</i> v. n.)	161
N. Fabritius Buchwald: Om <i>Plectania protracta</i> (Fr.) Gelin og <i>P. coccinea</i> (Fr.) Fckl. i Danmark (Summary: On <i>Plectania protracta</i> (Fr.) Gelin and <i>P. coccinea</i> (Fr.) Fckl. in Denmark)	166
Notitser	172
Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme (1938—1940)	188
Medlemsfortegnelse den 1. November 1941	(1)

*

REDAKTION:

C. FERDINANDSEN N. F. BUCHWALD

*

Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Rolighedsvej 23, København V.

Trykningen afsluttet November 1941.



SEVERIN PETERSEN

(1840—1929)

I ANLEDNING AF HUNDREDAARET FOR HANS FØDSEL

Af F. H. MØLLER.

Naar man med Banen sydfra nærmer sig Slagelse og lader Blikket vandre vesterud, standser det ca. 3 km Syd for Byen ved et Par store Høje, i hvis umiddelbare Nærhed en ret lille, tætbygget Landsby, Slotsbjergby, ligger. Dette Navn har for mange naturinteresserede faaet en særlig Klang, idet det var her, den gamle Læremester i Fuglenes Sang, i Sommerfuglenes og Svampenes Verden, Severin Petersen, levede og virkede i 35 Aar.

Lige fra jeg i 1911 kom i Forbindelse med Severin Petersen, havde jeg haft Lyst til at aflægge Slotsbjergby et Besøg for at lære Rammen om hans daglige Virke i Hjem, Skole og Kirke at kende, men aldrig var min Vej faldet didhen. Da skete det en klar Solskinsdag i Slutningen af Vinteren 1929, den 9. Marts, at jeg be-

fandt mig paa Vejen fra Slagelse til Slotsbjergby. Sneen laa i Dyn-ger ved Vejsiderne, og kun paa Kørebanen var den smeltet i Sol-varmen. Lærkerne hang jublende ude over Markerne, og paa Tele-fonpælene sad de skikkelige Bomlærker og trillede ensformigt. Og mens jeg skridtede af Sted, følte jeg det, som var jeg en Pilgrim, der gik paa hellig Jord. Her havde min gamle Ven og Kollega saa ofte vandret, lyttet til Fuglenes Sang og gjort sine Svampefund, i Bønderhaver, i Pilekrat, paa Kæmpehøje, paa Grøftekanter, i Moser og paa Enge. Nede mod Sydøst saas Falkenstens Have, som flere Gange omtales i hans Dagbøger, og der langt ovre mod Øst tegnede sig Slagelse Skovs massive Masse, hans forjættede Land, hvor han, som han selv har fortalt, fik sin Svampeinteresse vakt ved Fundet af den ædle Gylde Skælhat (*Pholiota VahlII*).

Men det var i en særlig Anledning, at jeg var kommet til Slots-bjergby. Folk i Byen, saavel som jeg selv, var sortklædte, for vi skulde alle følge vor gamle Ven, den næsten 89aarige Olding til Jorden. Alle, jeg traf paa, kendte og elskede deres gamle Skolelærer, og det blev en gribende og højtidelig Afsked, man tog med ham, saavel i Kirken som bagefter i Forsamlingshuset. Jeg ønskede at se den gamle Skole, hvor han som Enelærer havde undervist den meste Tid. Det var en lille, meget gammeldags, straataekt Bygning, nu uden Skolepræg. Solen kastede netop sit Lys ind over den, paa en Gren flammede et Knippe guldgule Paddehatte op, og en graa Kat strakte sig dovent uden for Døren, da jeg aabnede denne og derinde i det gamle Skolehjem traf forhenværende Gdr. Hans Olsen, en af Sev. Petersens gamle Venner. I Samtalens Løb fortalte han mig, at han for at hjælpe Sev. Petersen havde anlagt en lille Gangsti ned over sin Mark i Retning mod Slagelse Skov, som i lige Linie ligger c. 4 km borte. Vi maa jo huske paa, at Cykle ikke stod til Sev. Petersens Raadighed, saa en lille Genvej betød meget for ham. Jakob E. Lange, som har besøgt ham i Slotsbjergby, har fortalt mig, hvor lidt Dagslys han havde til at samle Svampe i. Hver Søndag var han jo optaget den halve Dag i Kirken som Kirke-sanger, og efter Skoletid ved 16-Tiden maatte han styrte ned over Markerne til Skovs for i Huj og Hast at faa skrabt noget Materiale sammen.

Det blev saaledes Severin Petersens Lod, at han ligesom mange andre Mykologer kun i sine forholdsvis korte Fritidsstunder — en Landsbylærer har ogsaa anden Virksomhed i Befolkningen end Skole- og Kirkearbejdet — kunde dyrke sine Interesser. Han kom

endda ret sent — i 40 Aarsalderen — ind paa sit egentlige Fritidsfelt: Svampene, men til Gengæld fik han et langt Liv og var aandsfrisk lige til det sidste. Han sagde saaledes til mig i 1926, 2½ Aar før sin Død: „Jeg kan endnu tydeligt se for mig de enkelte Lokalteter, hvor jeg har gjort mine mest mærkværdige Svampefund.“

Severin Petersen blev født den 17. Maj 1840 som Søn af Sognepræst J. Chr. Petersen i Borum ved Aarhus. Faderen forflyttedes imidlertid kort Tid efter til Tersløse ved Sorø, og saaledes kom Drengen til at henleve sin Barndom i den samme Egn, hvor han lukkede sine Øjne. Der var flere Søsken, hvoraf Broderen Otto, den senere Prof. O. G. Petersen, stod ham meget nær. Faderen, der under sin Skolegang paa Herlufsholm havde faaet vakt en stærk Interesse for Insekterne, besad en større Samling af disse Dyr, og under Paavirkning heraf, men særligt af et lille populært Skrift af O. Fr. Müller fra Faderens Bibliotek, vaagnede hos Drengen en levende Interesse for Sommerfuglenes Forvandlingsliv, og uden at anlægge nogen Samling — han nænnede jo aldrig at gøre noget Dyr Fortræd — erhvervede han sig et indgaaende Kendskab til forskellige Arters Biologi. Som Frugten af denne Interesse skænkede han sin Samtid en lille populær Bog: „De danske Sommerfugle“, udgivet 1885 af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme (ligesom 2 andre af hans populære Bøger: „Vore Sangfugle“ og „Det højere Svampeflor“).


Efter endt Skolegang var han en kort Tid paa Sorø Birkekontor og i Boghandlerlære i Slagelse, men blev saa optaget paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1861, var derefter Andenlærer i Hørby ved Holbæk til 1864, senere Lærer i Kastbjerg ved Mariager og andre Steder. 1867—72 var han Lærer ved Ryslinge Højskole, hvis Forstander, Pastor Johs. Clausen, senere blev hans Svo-ger. I denne Periode (og umiddelbart derefter) saa hans første litterære Arbejder Lyset i „Dansk Landbotidende“ 1871, prægede af hans Virksomhed som Højskolelærer, Smaaartikler, som belyser Skønheden ved Blomsterne eller omhandler Nyttegræsser (1874).

1872 ansattes han i Slotsbjergby, og i 1876 paa sin Fødselsdag indgik han Ægteskab med Cathrine Moltesen fra Raahede i Sønderjylland, en Søster til tidligere Udenrigsminister L. J. Moltesen. Hun overlevede ham, men er død for et Par Aar siden. I Hjemmet opvoksede en Flok dygtige Børn, der alle kom i gode Stillinger. Hans Fritidssysler optog ham meget — han fandt forøvrigt heri fuld Forstaaelse hos sin gode og trofaste Hustru — og foruden at

dyrke Sommerfugleinteressen og Kærligheden til Blomsterne var han i Tidens Løb blevet en passioneret Fugleelsker; især Fuglesangen glædede ham, og han opnoterede omhyggeligt de forskellige Sangfuglestrofer. „Vore Sangfugle“ (1. Udg. 1878, 3. Udg. 1905) og den lille Artikel: „Borgø og dens Fuglesang“ („Smaastykker“ 13. Bd. 1886. Ved „Udvalget til Folkeoplysningens Fremme“) er et smukt Udtryk for denne Interesse. I Anledning af 70 Aars-Fødselsdagen skrev „Sorø Amtstidende“ følgende Linier om ham (citeret i Uddrag efter „Folkeskolen“): „Severin Petersen har altid været tidlig paa Færde. Alt, hvad der er smukt og harmonisk, tiltaler ham. Før og efter Skoletid ilede han — mens han var Lærer — omkring i Mark og Skov for at samle Indtryk og forfriskes til sin Gerning i Skolen. Hvad han her paa disse Vandringer med sit klare Øje — selv for det mindste i Naturen — saa og med sit lydhøre Øre hørte, følte han sig forpligtet til *deraf* at gøre sin Samtid og Efterslægten bekendt med saa meget, som han kunde magte. Saa sad han i Aften-timerne — tit langt ud paa Natten — og arbejdede med dette smukke Formaal for Øje... Hvad der særlig udmærker Severin Petersen fremfor mange andre Forfattere, er den Tilforladelighed, hvoraf saavel hans Tale som hans skriftlige Arbejder er præget. Altid livlig, letfattelig og interessant er denne elskværdige Mand. Hvor det dog er en Fornøjelse at læse hans Bøger. Han giver ikke halv Besked, men fuldt Lys er kastet over selv det mindste. Under sine tidlige Morgenvandringer lagde han med Fryd Mærke til Sangfuglenes glade Morgensang, idet de vaagnede. Til sidst kendte han hver Sangfugl paa dens Stemme. De forskellige Toner fæstnede sig i hans Øre og er mesterligt fremstillet i hans Bog: „Vore Sangfugle“. Mon nogen Lærer har været mere med i Morgensangen end han, naar f. Eks. Sangen: „Nu vaagner alle Guds Fugle smaa“, blev sunget?...“ I denne Forbindelse kan omtales, hvad den kendte Skole- og Sprogmand Martin Hammerich i Brev til Sev. Petersen af 29. 1. 1879 skrev om „Vore Sangfugle“: „Fuglebogen skrev De med saa megen Sands og Omhu, at det var mig langt mere Fornøjelse end Arbejde at gennemgaae den“.

Som allerede nævnt fik Severin Petersen sin Svampeinteresse vakt ved Synet af en Klynge smukke Svampe i Slagelse Skov (se „Meddelelser“ Bd. 1., S. 95—97 og Bd. 2., S. 1—4). Det var i 1881. Hans gamle Lærer, E. Rostrup — dengang endnu ansat ved Skaarup Seminarium — bestemte hans Fund til *Pholiota VahlII*, og denne Svamps Skønhed, dens Sjældenhed — ikke fundet i c. 100

Aar — og dens Historie — først iagttaget af den danske Botaniker M. Vahl og navngivet af Chr. Fr. Schumacher — lukkede hans Øjne op for et Naturrige, som hidtil havde været upaaagtet eller i nogen Grad tilsidesat her i Landet. Ivrigt ansporet af R o s t r u p begyndte han nu at studere de højere Svampe, og denne



Interesse voksede efterhaanden saa stærkt hos ham, at den skubbede hans andre Fritidsstudier i Baggrunden. R o s t r u p, som selv i Aarene 1860—70 havde Interesse for disse Svampe, men nu var gledet ind paa Studiet af Smaasvampene, kunde i Begyndelsen hjælpe ham med Bestemmelser. Men allerede 1882 (til 1885*) var han kommet i Gang med at sende Svampe til Dr. M. A. L i n d b l a d i Stockholm til Kontrol og Bestemmelse. Det ser ud til, at han ikke i de

*) Sev. Petersen opgiver selv („Agaricineer iagttagne i Omegnen af Slagelse“) 1882—84, men sidste Brev fra L i n d b l a d er fra 1885.

første 8 Aar har ført Dagbøger, idet den første Dagbog, som er opbevaret, stammer fra 1889, og fra 1885 til 1888 synes han ikke at have haft Støtte af nogen udenlandsk Kapacitet.

Derimod droges han nærmere til Hovedstaden. Siden 1867 havde han været Medlem af Botanisk Forening, hvis Formand, Joh. Lange, havde modtaget Plantelister fra ham til sin Flora — Severin Petersen var nemlig ogsaa en dygtig og interesseret Kender af Fanerogamer — og i Aaret 1883 var Rostrup blevet forflyttet til Landbohøjskolen og blev Aaret efter indvalgt i Bestyrelsen for Botanisk Forening, der snart begyndte at afholde aarlige Svampeekskursioner, i hvilke Severin Petersen var en sikker Deltager, ligesom han ordnede Foreningens Svampeudstillinger.

I 1888 er Sev. Petersen i livlig Korrespondance med Dr. Robert Fries, Læge i Gøteborg og Søn af Elias Fries. Denne Mand, der næsten aldrig paa Grund af sin store Lægepraksis havde Tid til at sætte Aarstal, ofte heller ikke Dato paa sine Breve, ofrede sig i en sjælden Grad for Severin Petersen. En Lørdag kom han til Slagelse (14. 9. 89), besøgte Slotsbjergby og botaniserede i Slagelse Skov. Fra da af var de Venner for Livet (og Venskabet overførtes til Svigersønnen Prof. Mörner). Et intimt Samarbejde paafulgte. Sev. Petersen kunde sende Svampe til Vennen fra de danske Bøgeskove, og den kyndige Svensker blev ved at give Sev. Petersen gode Raad i de følgende 20 Aar. Fries' Breve er for største Delen opbevarede og indeholder interessante Enkeltheder vedrørende hans Faders Anskuelser.

Imidlertid havde Sev. Petersen indtil 1889 faaet indsamlet og bestemt c. 400 Bladhatte, hvilke publiceredes i Botanisk Tidskrift Bd. 17, 1889, S. 111—140 („Agaricineer iagttagne i Omegnen af Slagelse“), men han er ganske klar over, at der andre Steder i Landet findes helt andre Arter, og Lysten til at komme rundt til andre Lokalteter, samt til at erhverve Mikroskop (1892 findes de første Sporetegninger i hans Dagbøger) og ny Belæring af Fries ved daglig Omgang er vaagnet. Heldigvis blev han hjulpet i disse Bestræbelser af sin gamle Velynder E. Rostrup og nye Venner, hvoriblandt foruden Robert Fries var E. Warming og Emil Chr. Hansen. Ved Anbefalinger fra disse lykkedes det ham at opnaa Støtte fra Kultusministeriet og Carlsbergfondet, og i Augustmaanederne 1890 og 96 arbejdede han under Vejledning af Fries i Gøteborgegnen. Fries havde i 1888 under et Stockholmerbesøg

lært Lars Romell personligt at kende, og Aaret efter modtaget Besøg af denne. Fries berømmer i sine Breve Romells Dygtighed og Bravhed, og det varer ikke længe, før Sev. Petersen er i livlig Kontakt med Romell. I Aarrækken 1891—97 udvekslede disse 2 Forskere Materiale og Tanker. Det var navnlig *Russula*-Arter, Romells Speciale, som Sev. Petersen søgte Information om.

Saaledes var nu de svenske mykologiske Traditioner ved Trekloveret: Lindblad—Rob. Fries—Romell blevet tilført dansk Mykologi, og gennem Sev. Petersens Elever spores denne Paavirkning endnu.

1895 kom en lille illustreret populær Bog: „Det højere Svampeflor“, som ved sin fornuftige Ordning af de letkendeligste Svampe typer inden for alle højere Svampe, sin Prisbillighed og sit tiltalende Sprog, hvoraf Uddrag er blevet citeret (Buchwald, Mörrner), vandt Svampene nye Venner. Forfatteren siger i Forordet, at Forsøget paa at skrive en saadan Bog ikke har været let. Dette kan begrundes ved, at Bogen, som N. F. Buchwald i sin Nekrolog over Sev. Petersen („Naturens Verden“, 1929) anfører, er den første egentlige danske mykologiske Flora.

Da Rostrups „Blomsterløse Planter“ udkom 1904, udarbejdede Sev. Petersen Afsnittet om Bladhattene (S. 88—145, omfattende c. 150 Arter). Men han havde sat sig et større Maal, nemlig en samlet Oversigt over alle danske Bladhatte. Han berejste nu flittigt i sine Ferier forskellige Egne af Landet, særligt de fleste Egne af Sjælland, Maribo-Skovene, Brahe-Trolleborg-Egnen, Ribe Marsk og Plantager, Fanøklitterne, Bramminge—Brørup-Egnens Plantager, Bøgeskove, Egekrat, Moser, Heder o. l., Skovene ved Aarhus og Kolding osv. Samtidigt blev der af interesserede tilsendt ham Svampe til Bestemmelse, overvejende fra andre Dele af Landet, saaledes fra Vendsyssel (Marie Krøyer, M. L. Mortensen), fra Aarhus (Poul Larsen), fra Bramminge (Pilsted), fra Fyen (Chr. Clausen, Jakob E. Lange), fra Vestlolland (J. Büchmann), fra Sjælland (C. Mundt, H. Mortensen, E. Warming, Emil Chr. Hansen, E. Rostrup, C. Raunkiær o. m. a.) Paa Grundlag af dette Materiale og Schumachers Fund m. m. naaede han paa Carlsbergfondets Bekostning at faa udgivet: „Danske Agaricaceer“ 1907 og 1911, 460 S., omfattende ialt c. 900 Arter. Beskrivelserne er Oversættelser af Forfatternes originale Beskrivelser, eventuelt med Tilføjelse af egne eller andres Spore-

maal o. l., og hertil har han saa i mange Tilfælde knyttet forskellige kritiske Bemærkninger m. m.

Der er mod denne Arbejdsmaade indvendt, at en helt personlig Beskrivelse af de fundne Arter var at foretrække. Men Severin Petersen har flere Gange skrevet eller sagt til mig: „Mit Arbejde er kun rent foreløbigt. Bagefter tilkommer det andre at lave Monografier over de enkelte Slægter“. (Jævnf. Indledningen til „Danske Agaricaceer“). Han tilsigtede kun en foreløbig Oversigt over alle danske Bladhatte, og derfor kunde han i sin knappe Fritid til Trods for ihærdig Flid ikke arbejde saa dybtgaaende, som han forøvrigt ønskede selv. Han udtrykte det selv omtrent saaledes: „Det er meget forfriskende at brede sig og lære nye, interessante Arter at kende, men jeg fortryder, at jeg har spredt mig saa meget i mine yngre Aar alligevel“.^{*)} Robert Fries har bedømt 1. Hefte saaledes: „Arbetet gör Er mycken heder och synes mig ovanligt felfrit — mer än man plägar få se i mykol. verk . . . En anmärkning torde kanske från en eller annan göres — att så få nya arter beskrifvits. Detta anser jag emellertid snarare för en fortjenst — det är nämlig bra mycket viktigare att ha väl reda på de gamla förut beskrifna än framstilla nya isynnerhet som inga plancher medfölja. Jag tror således att Ni handlat klokt häruti“. Blandt de 900 Arter er kun et Par nye Arter og en Snes nye Varieteter, til hvilke der dog ikke er udarbejdet latinske Diagnoser. Han var lige saa beskeden som Ricken. Engang skrev han saaledes til mig (1922): „Paa næsten hver Ekskursion træffer man paa Former, som ikke helt falder sammen med nogen Beskrivelse. Af saadanne har jeg mange i mine Dagbøger, og de interesserer mig selvfølgelig meget — men jeg skal nok vogte mig for — saa vidt muligt — at opstille nye Arter. Det er der nok, der gør. Det kedelige ved disse nye Arter er, at de næsten aldrig genfindes, medens de paa den anden Side gør Litteraturen vanskeligere at benytte, end den ellers er. Vanskeligheden beror vist paa, at Hatsvampene ikke er skarpt artsbegrænsede, men gaar over i hverandre ved mere eller mindre tilfældige Mellemlid.“

„Danske Agaricaceer“ skaffede Sev. Petersen en udmærket Ven og Medarbejder i den norske Mykolog John Egeland, som besøgte ham et Par Gange i Sorø, hvortil Severin Petersen

^{*)} Han tænkte med disse Ord paa de Svampearter, der ikke hører til Bladhattene.

var flyttet, efter at han havde taget sin Afsked fra Skolen 31. 12. 1907. E g e l a n d var meget religiøs. I deres Breve gør de hver for sig Rede for deres Forhold til det guddommelige. Et Citat fra E g e l a n d kaster Lys over S e v e r i n P e t e r s e n: „Det glæder mig at se, at De staar i det barnlige tillidsforhold til Gud, som De har givet saa vakkert udtryk for i de enkle ord: „Guds vilje ske! saa er alt godt“.“ — Denne Udtalelse anser jeg for meget rammende. Ogsaa en lille Aftensang, som S e v e r i n P e t e r s e n engang skrev, og som blev sunget ved hans Begravelse, vidner om hans tillidsfulde Gudsforhold.

Efter Udgivelsen af „Danske Agaricaceer“ standsede S e v. P e t e r s e n ikke sit Arbejde med disse Svampe, men rejste om muligt endnu mere om i Landet, besøgende sine Børn og Venner, og i de paafølgende 15 Aar fik han i sine Dagbøger indført en Mængde nye Fund, som han dog ikke opnaaede at faa udgivet, skønt han havde planlagt en Revision af og et Supplement til sit Hovedværk. Ogsaa fra Sønderjylland, hvis Genforening med Moderlandet havde kastet Glans over det gamle Ægtepars sidste Aar, havde han indsamlet Stof, idet han i en Alder af 81 Aar (1921) foretog en Rejse til Sommersted—Graasten. Han gjorde sikkert denne sidste større Undersøgelsesrejse af særlig Pietet for den Landsdel, hvorfra saavel hans Hustru som hans egen Slægt længere tilbage stammede.

Han var altid flink til at hjælpe andre med sin Viden — herom kan hans Elever tale*) — og i andres Arbejder træffer man af og til hans Navn, saaledes i W a r m i n g s „Dansk Plantevækst“ (Svampe-lister). I „Botanisk Tidsskrift“ skrev han i sine yngre Dage Ekskursionsberetninger, og i de senere Aar: „Agaricineer iagttagne i Om-egnen af Sorø i Juli Maaned 1918—19—20“.

I de sidste Aar af sit Liv arbejdede han med et Register til P e r s o o n s Værker, hvilket er deponeret som Manuskript i Botanisk Museum. Men naar de levende Svampe kaldte, var han „Persoon“ utro. 1926 stod Mikroskopet endnu paa hans lille Skrivebord!

*) Saaledes skriver J a k o b E. L a n g e til mig: „Jeg lærte ham først nærmere at kende hen imod århundredskiftet. Hans beskedenhed var overmåde stor. Han vilde saaledes ikke engang have sit navn hæftet til *Omphalia graveolens*. Og han var jo desværre ogsaa noget for bange for at give sit eget i beskrivelserne. — For mig havde han stor betydning i de første ensomme åringer. R o s t r u p havde jo omtrent lagt agaricaceerne på hylden, da han var blevet patologisk professor, og andre agaricologer kendte jeg ikke, så uden ham havde vejen frem på begynderbanen været trang for mig“.

visade att de voro hattsvampar med ett allmänt hylle, hatt och fot; diametern blef omkr. 1 cm., färgen helvit, konsistensen som förut.




Fig. 2. *Volvaria Loveiana*. Unga fruktkroppar, mycket svagt förstörade. 5. 10. — 10. 10. 1934.

⁸/₁₀. — Hos de största hade hyllet spruckit nära toppen och visade i sitt inre en hattsvamp, hos vilken den ⁹/₁₀ t. o. m. kunde urskiljas lameller (Fig. 3). Konsistens och färg som förut. Jag tog in svamparna från gården, dessa hade utvecklat sig sämre och längre fram dog äfven flere ex. af dessa senare än af dem, som hållits inne i mit rum, innan de hunnit växa ut.




Fig. 3. *Clitocybe nebularis* med 2 fruktkroppar av *Volvaria Loveiana*. ¹/₁. 9. 10. 1934.

¹⁰/₁₀. Hatten hade höjt sig ur hyllet, som nu bildade en strumpa i form af en trasig äggskal vid fotens bas (Fig. 4). Konsistensen, som förut; färgen fortfarande helvit både utan och innan. Cystider och basidier med sterigmer och början till sporer funnos, men inga färdiga sporer (Fig. 5).




Fig. 4. *Volvaria Loveiana*. $\times 1\frac{1}{2}$. 10. 10. 1934.

Hattens yta varierade från slät och sidenglänsande men mjuk hos unga exemplar til svagt och fint luddig och slutt. mjukt sprucket småfjällig mot kanten hos äldre exemplar. Foten saknade ring.

¹¹/₁₀. Svampkropparna växte ytterligare. Enda förändringen f. ö. var att luddigheten tilltagit; luddet nådde i allm. ej hattranden utan liksom drog sig tillbaka från denna. — Utvecklade sporer funnos fortfarande ej och jag började frukta för att ej få sådana. Då några hattar började visa benägenhet att vissna, lät jag fotografera svampen. Senare på dagen hade sporer utvecklats, de hade ljusröd färg, $6-7 \times 4-4.5 \mu$, och jag kunde med säkerhet föra arten till släktet *Volvaria*. Lamellerna antogo nu ljusröd färg och man kunde se svagt gul- eller brunaktiga fläckar på hattar, som börjat vissna, f. ö. var svampen ss. förut helvit. Arten fann jag ej i min litteratur

mig om, at det virkelig er denne Art, jeg er stødt paa. Da Sagen kan have nogen Interesse for andre „Svampesøgere“, vil jeg meddele mine egne Optegnelser om Fundet.

Hatten 4—6 cm, pudeformet hvælvet til udbredt-flad med i Begyndelsen svagt filtet-punkteret Overflade, snart omtrent glat. Randen først med indrullet, siden udstaaende skarp Kant, tilsidst tiltrykt but, svagt revnet (tørt Vejr). Hatten tør. Farven oliven-graagul, snart graabrunlig; ved Tryk rødbrun-sortbrun.

Kødet blødt, lidt gummiagtigt, citrongult, i Stokspidsen næsten safran-brungult; i hele Svampen hurtigt og stærkt blaanende: dybt kornblaat til mørkeblaat, senere graagrønlgt og tilsidst (varigt) graagult-rødlgt. Uden fremtrædende Lugt og Smag.

Rørlaget 0,5—1,0 cm, let at skille fra Hattens Substans, først svovlgult-livligtgult, senere dybgult til grøngult eller sortebrunt, lidt udrandet, lamelagtigt nedløbende paa Stokken. Mundingerne først temmelig snævre, senere ret vide, kantede og tandede.

Stokken 4—6 × 1—1½ cm, krummet, svagt buget, undertiden noget forvreden, forneden lidt tilspidset med næsten træhaard Spids — tæt og fast. Stokken foroven citron-guldgul, paa Midten rødbrun, nedefter næsten sortbrun og særlig foroven med rødgule og brunrøde Smaaskæl eller Punkter. Ingen Netmasker. Stærkt blaanende eller mørknende ved Berøring.

Sporerne smalt ellipsoidiske til valseformede, 10—14 (enkelte 16) × 3½—4½ μ , glatte. Støvet grøngult, olivenbrunt.

Voksested: Nøgen Skraaning og noget græsgroet Kant af Hullevej med leret, noget moragtig Bund under Bøg, men med Granplantage paa den anden Side Vejen.

Noget karakteristisk Billede kan jeg desværre ikke give, men maa henvise til Kallenbach's og Konrad's Billeder. Det var kun forholdsvis smaa Eksemplarer, jeg fandt; de to havde næsten sammenvoksede Stokke, der brød frem ved en Bøgerod paa Skraaningen. Det bedste Skelnemærke er ubetinget den hurtige og stærke Blaanen og den stærke Modtagelighed for Tryk og Indgreb i det hele. Medens de fleste Former af den almindelige *B. subtomentosus* har næsten uforanderlig Kødfarve, er en Blaanen eller Rødmen stærkere hos *B. chrysenteron*, endnu stærkere — især i Stokken og hos ældre Eksemplarer — hos *B. versicolor*, *B. pruinatus* o. a. og stærkest hos *B. pulverulentus*. Da Arten i det hele — den svage, ganske vist snart forsvindende „Behaaring“ af Hatten, Stokkens Form og Farve, Sporernes Forhold — minder om *B. subtomentosus*-Gruppen, kan

den maaske bedst opfattes som et Udviklingsled i den Kæde af Smaaarter, der danner denne Gruppe.

Som nævnt er Arten formentlig hverken her i Landet eller andre Steder saa sjælden, som man tror, da den uhyre let overses eller forveksles med andre *Boletus*-Arter.

Denne Formodning har jeg da ogsaa allerede faaet bekræftet, idet jeg ca. 1 Maaned senere fandt 2 Eksemplarer — et gammelt og et ret nyt — i Søby-Søgaards Skov (ved Nørre-Søby St.), ligesom ogsaa Forstander J a k o b E. L a n g e, Odense, meddelte mig, at han i Midten af September (1932) har fundet et enkelt Eksempel i Langesø Skov.*)

Bred Skole, Fyn.

*) Sml. endvidere S. 181 i nærværende Hefte.

BEMÆRKELSESVÆRDIGE PADDEHAT-FUND

I DE SENERE AAR

Af JAKOB E. LANGE

Den voksende Interesse for vor Svampeflora fører Aar for Aar til nye Fund rundt omkring i Landet. Nogle faa af de mere interessante skal jeg her kortelig omtale.

Klitterne har deres egen Svampeflora — endnu dog kun lidet undersøgt. Det synes som denne Sand-Flora, ligesom Tørvemos-Floraen og Gødningssvampene, er ret ensartet i de forskellige Dele af Verden. De særlige Vokseforhold er vel ogsaa mere bestemmende end Klima og Vejrlig. — Til Klitfloraen her i Danmark hører blandt andet nogle Trævlehat-Arter, af hvilke den største og mest iøjnefaldende, *Inocybe serotina* Peck (sensu Heim), i Oktober 1936 blev fundet af Morten Lange i Klitterne ved Blaavand. Det er en Svamp, der kan blive over 5 cm i Hat-Tværraal. Stokken er halvvejs begravet i Sandet og Hatten næsten inkrusteret af Sand (Hatten er sandsynligvis noget smattet som ung). Ejendommeligt er det, at Arten, der oprindeligt er beskrevet af Peck i forrige Aarhundrede fra U. S. A., nu for nogle faa Aar siden er fundet i Holland og saa hos os.

En anden sjælden Trævlehat, *Inocybe hæmacta* B. & C., er fundet flere Gange her i Landet i de senere Aar og er saa let kendelig, at den er forholdsvis nem at eftersøge og identificere, selv uden Mikroskop. Den har nemlig en graagrøn Stok, og Hatkødet bliver ved Overskæring mere eller mindre lyst kirsebærrødt i Pletter. Den gror paa Muldbund og er rapporteret baade fra Jylland og fra Øerne af forskellige „Jægere“.

Af Slægten Bredblad (*Stropharia*) er der en anelig Art, *S. hypsipoda* Fr., som hidindtil forgæves har været eftersøgt her til Lands. Den udmærker sig ved sin høje, hvide Stok (næsten som Paryk-Blækhattens) og en hvidlig, flad Hat. Stokken har en temmelig højt siddende Ring. Et lille Knippe af denne Art fandt jeg i en

Skovgroft under gamle Aske o. a. Træer ved Hesselagergaard i Oktober 1935.

Sneglehattenes Antal af danske Arter er blevet betydelig forøget i de senere Aar, dog ikke ved Fund her paa Fyn, men i Jylland og Landets østlige Egne. (Poul Larsen, F. H. Møller og M. P. Christiansen). Nogle af disse Arter, de gule eller orange-farvede *Limacium aureum* (Arrh.) Fr. og *L. lucorum* Kalchbr., er knyttet til Lærketræet, medens den store, blegt kødfarvede *L. pudorinum* Fr. vokser i almindelig Løvskov.

Derimod er der af de beslægtede Vokshatte fundet to sjældne Arter her paa Fyn. Den ene af disse, Lakmus-Vokshatten, *Camarophyllus lacmus* Fr., kendetegnes ved sin temmelig tørre, lilla-graa eller graalig-lilla Hat og navnlig ved sine smaa, næsten kuglerunde Sporer. Det er en „dansk“ Art, oprindelig beskrevet og afbildet i *Flora Danica* og nu genfundet ved Odense paa en Aaskrænt (Morten Lange). Den tjeckiske Forfatter Velenovsky har ogsaa nylig fundet den og beskrevet den under Navn af *Hygrophorus globisporus*.

Den anden Vokshat er en besynderlig lille sortprik-stokket Art. Allerede Fries beskriver den, men synes ikke at kende videre til den, da han anbringer den blandt de rødsporede. Derimod afbilder Bresadola den udmærket i sit store Billedværk (hovedsagelig omfattende Svampe fra Tyrol). Han henfører den til Navlehattene (*Omphalia*); men dens tykke, voksagtige Lameller gør det mere naturligt at anbringe den blandt Vokshattene (som *Camarophyllus atropunctus* (Pers.) Lange). Det er forøvrigt en ganske lille Svamp, Hatten omtrent 1—1½ cm, sodfarvet, ligesom de smaa Prikvorter paa Stokkens øvre Halvdel. Svampen vokser paa Skovbunden mellem Løv, hvor den kan træffes til hen paa Vinteren.

Af større, mærkelige Svampe fortjener særlig at nævnes den store Mælkehat, *Lactarius resimus*, fundet af Adjunkt Arne Larsen i Sandflugtskoven ved Rønne (1937). Fra de andre store, hvidlige Mælkehatte kendes den let ved, at Kødet, navnlig lige under Lamellerne, ved Gennemskæring antager en svovl- eller citrongul Farve.

Af Posesvampenes særprægede Slægt fandt jeg (1931) i Vermont (U. S. A.) en lille, meget karakteristisk Art, let kendelig ved sin groft trævlskællede, hvide Hat og dunede Stok. Den er beskrevet allerede i 1870'erne af den amerikanske Mykolog Peck (under Navn af *Volvaria pubescentipes* Peck), men synes at være ret

sjældnen derovre. Det var overraskende at finde et Par Eksemplarer af denne Art — nøjagtig som den amerikanske — i Bøgeløv i Strandskoven ved Lundeborg, Sommeren 1940.

Disse uhyre sjældne, men vidt udbredte Svampearter frembyder et mærkeligt Problem. Eksemplerne er talrige: I 1931 fandt jeg paa Stillehavskysten (i Oregon) et Par Eksemplarer af den lillebitte, hvide Parasolsvamp, *Lepiota cygnea* Lg., som paa denne Side Atlanterhavet kun er kendt fra Odense, hvor jeg har fundet nogle faa Eksemplarer et Par Minutters Gang fra mit Hjem. Paa Rodhalsen af Kulsukker har *Bresadola* (i Tyrol) fundet en lille, spinkel, Navlehat (*Omphalia candida* Bres.), omtrent af Størrelse som *O. fibula*, men mælkevid. Den er senere fundet i Frankrig. Kulsukker er jo ret sjældent i Danmark. Men i 1939, paa en Ekskursion til Tommerupegnen sammen med min Søn Morten Lange, stødte vi paa en Plet forvildede Kulsukker: og dér var Navlehatten! Af den store og pragtfulde, men sjældne Mælkehat *Lactarius scrobiculatus* (Scop.) Fr., med guldgul Hat og gulnende Mælk, findes en Varietet, som gaar under Navnet *L. repraesentaneus* Britz. (oprindelig beskrevet fra Bayern), hvis Mælk anløber violet. Jeg havde søgt den forgæves i en Menneskealder herhjemme, men i Adirondacks-Bjergene (Staten New York), ved „7. Sø“, optraadte den i fuld Vigør. Og nu i 1940, ved Ekskursionen til Herlufsholm, fremviste F. H. Møller den, samlet Dagen før i Virket Lyng.*) — Den lille, brungule Navlehat, *Omphalia campanella* (Batsch) Fr. er let kendelig ved sin tueformige Vækst og Voksestedet (Naaletræ-Stubbe). Der findes imidlertid en meget lignende Art, som gror i Flokke paa Naalebund, men ikke knippevis. Den gaar under forskellige Navne, bl. a. *Marasmius caudicinalis* (With.) Fr. Ogsaa denne havde jeg forgæves eftersøgt i mange Aar — da jeg oppe i Central-Kanada, i Winnipeg-Egnens Bjerge fandt den voksende i Fyrreskov. Og nu optræder den i Mængde i Kongelunden paa Amager! (Morten Lange). Og saaledes kunde man blive ved at anføre overraskende Eksempler.

En meget iøjnefaldende Skærmhat, nær beslægtet med *Pluteus cervinus* (Schaeff.) Fr. (Sodfarvet Skærmhat), optraadte i afvigte Efteraar paa Savsmuld-Dyngne ved Kirkeby Savværk i Sydbyn. Den kan kaldes *Pluteus atromarginatus* (Konr. et Maub.) Lg. (Sortrandet Skærmhat) og bør betragtes som en særegen Art, afvigende fra mørke Former af *P. cervinus* ved sin robuste Vækst, sorte Hat, sort-

*) Se dette Hefte, S. 204.

randede, bleggraa Lameller m. v. — Savsmulddynger er i det hele taget et Eldorado for mange Svampe, der her optræder i Kæmpeformer eller tæt tuevoksende, vel sagtens paa Grund af den let tilgængelige og rigelige Næring.

Den lille Slægt *Bolbitius* (der maaske kunde kaldes *Hjulhat*) har noget tilfælles i Udseende med de smaa Blækhatte (f. Eks. *Hjul-Blækhat*), men er nærmere beslægtet med *Hjælmmhattene* (*Galera*), som de ligner ved deres rustbrune Sporestøv. Der forekommer en Mængde Former, fra helt smaa, næppe centimeterbrede, hindeagtige Hatte til 3—4 cm brede, noget kødede. Men de allerfleste kan uden Vanskelighed henføres til Arten *B. vitellinus* (Pers.) Fr. (Størrelse-Variationen er jo tit stor hos Svampe, der gror paa gammel Gødning, Tang, raadne Sække etc.) Men ifjor fandt jeg dog en lille Form, som fortjener eget Navn, *B. lacteus* Lg., Mælkehvid *Hjulhat*. Den er helt hvid, uden Spor af den for de øvrige Former karakteristiske æggegyule Farve. Den voksede mellem Græs paa Grønsvær i Skov ved Odense.

Pælerods-Fladhat (*Collybia radicata* (Relh.) Fr., der jo er kendt af enhver, indtager en ret isoleret Plads. Blandt vore almindelige Svampe har den ingen nære Slægtninge. Der findes dog en saadan (*Collybia longipes* (Bull.) Fr., eller rettere en hel Formkres af *Pælerods-Paddehatte*, hvoraf to er fundet enkelte Steder i Danmark. Begge afviger de fra den almindelige *Pælerods-Fladhat* ved deres Stok- og Hatbeklædning (og visse mikroskopiske Kendetegn). Men medens den ene, der kunde kaldes *Collybia fusca* (Quél.) Lg. og er fundet paa Sjælland*), har sodbrun, fløjelsagtig Hat, og sodbrun, hviddugget Stok, har den anden, *Collybia badia* (Lucand) Lg., der er fundet her ved Odense af Morten Lange i 1937, en blegere brun, noget filtet Hat og kanel-kastaniebrun, plydsagtig Stok-Beklædning. En tredje Form, nærmest beslægtet med *C. fusca*, har jeg set i Amerika i 1931. De bør nærmere eftersøges og undersøges til Udredning af deres Forhold.

SUMMARY

Notes on rare Agarics recently found in Denmark.

Brief popular notes are given on the following rare Agarics which recently have been recorded from Denmark: *Inocybe serotina* Peck (sensu Heim) in sand-dunes (North Sea coast), *Inocybe hæm-*

*) se bl. a. Friesia I: 322. 1936.

acta B. & C. on humous ground in woods of *Fagus*, *Stropharia hypsipoda* Fr. under old *Fraxinus*, *Limacium aureum* (Arrh.) Fr. and *L. lucorum* Kalchbr., both under *Larix*, *L. pudorinum* Fr. in frondose woods, *Camarophyllus lacmus* Fr., a species originally described from Denmark, but first now met with again, *Camarophyllus atropunctus* (Pers.) Lange, a very rare Agaric, and *Lactarius resimus* Fr., found in Bornholm.

Volvaria pubescentipes Peck (which the author found in Vermont (U. S. A.) in 1931) was met with here in Denmark in 1940, a new and striking example of the fact that many rare agarics can be met with on both sides of the Atlantic, e. g. *Lactarius scrobiculatus* (Scop.) Fr. var. *repræsentaneus* (Denmark and the Adirondacks in New York State), *Lepiota cygnea* Lg. (Denmark and Oregon), *Marasmius (Xeromphalina) caudicinalis* (With.) Fr. (Winnipeg and Copenhagen) etc. — *Omphalia gracilis* which Bresadola describes from Tyrol (growing on *Symphytum*) was met with on the same host in Denmark in 1939.

Pluteus atromarginatus (Konr. et Maub.) Lg. which differs from robust forms of *P. cervinus* by the black-edged, pale gray gills etc. deserves specific rank. It grows on sawdust-heaps like the white, gigantesque species *P. petasatus* Fr.

Bolbitius lacteus Lg., found in 1939 near Odense, differs from all the forms of *B. vitellinus* (Pers.) Fr. by its milk-white cap, completely devoid of the egg-yellow colour. — Two forms of the collective species *Collybia longipes* (Bull.) Fr., viz. *C. fusca* (Quél.) Lg. with a soot-brown, velvety cap and a soot-brown, white-pruinose stem and *C. badia* (Lucand) Lg. with a cinnamon bay-brown, plushy stem have been met with in Denmark in recent years. A third form, close to *C. fusca*, but paler, was met with by the author in U. S. A. in 1931.

Odense, Februar 1941.

LIDT OM HYMENOFORETS VARIATION HOS PORESVMPE OG EN NY VARIETET AF DAEDALEA QUERCINA (L.) PERS., D. QUERCINA VAR. IRPICIFORMIS.

AF N. FABRITIUS BUCHWALD

Hos den overvejende Del af Poresvampene (*Polyporaceae* s. str.) er Hymenoforet udviklet i Form af Porer eller Rør (poroid Udvikling)*), men hos adskillige træffer man dog ogsaa andre Udviklingstyper af Hymenoforet, saasom Lameller, labyrintiske Gange, tandformede Plader (henholdsvis lamelloid, daedaloid, irpicoid Udvikling) o. lign. I visse Tilfælde spiller de ydre Kaar en afgørende Rolle for Fremkomsten af disse afvigende Hymenofortyper, der i saa Fald maa betragtes som Modifikationer, men i de fleste Tilfælde er de overvejende anlægsbestemt, altsaa Variationer. Inden for den sidstnævnte Kategori kan der atter sondres mellem aldersbestemte Variationer og saadanne, der i Mangel af et bedre Udtryk, kan kaldes artsbestemte Variationer.

1. MODIFIKATIONER (KAARBESTEMTE VARIATIONER).

Hertil maa bl. a. henregnes de Hymenofortyper, hvis Udvikling staar i en mere eller mindre tydelig Forbindelse med Frugtlegemets Stilling til Substratet, idet alle Overgangsformer mellem et typisk poroidt og et typisk irpicoidt Hymenofor kan træffes paa samme Frugtlegeme, alt efter som det udvikles i vandret, skæv eller lodret Stilling. Disse afvigende Former finder man navnlig inden for de resupinate Poresvampe (*Poria* s. lat.). Som et udmærket Eksempel kan nævnes den velkendte *Poria mucida* Pers. (*Poria versipora* Pers.), der er yderst almindelig paa trøsket Ved (Stød, nedfaldne Grene) og snart optræder med almindelige Porer, snart med *Irpex*-agtige, tandformede Plader, som undertiden kan antage Form af Pigge;

*) I den moderne Systematik er Afgrænsningen af Poresvampe blevet stærkt indskrænket, idet flere Grupper med en poroid Udvikling (*Boletaceae*, *Fistulinaceae*, *Meruliaceae* og *Scutigeraceae* [der bl. a. omfatter *Polypilus frondosus*, *Scutiger ovinus* og beslægtede Arter]) nu henføres andetsteds.

den poroide Form udvikles i vandret Stilling, den irpicoide Form i lodret Stilling og Mellemformerne i intermediære Stillinger. Den irpicoide Form blev tidligere opfattet som en selvstændig Art, beskrevet under forskellige Navne som *Irpex obliquus* (Schrad.) Fr. eller *I. paradoxus* (Schrad.) Fr. Langt fra alle *Poria*-Arter opfører sig dog paa denne Maade, og i den moderne Systematik henfører man nu *Poria mucida* og beslægtede Arter, hos hvilke man møder en tilsvarende Evne hos Hymenoforet til irpicoid Udvikling, til en særlig Slægt, *Xylodon* Karst.

2. ANLÆGSBESTEMTE VARIATIONER.

a. Aldersbestemte Variationer. Hos andre Poresvampe er Variationen i Hymenoforets Udvikling væsentligt et aldersbestemt Fænomen. Saaledes finder man hos mange Arter inden for Slægten *Tyromyces* (*Leptoporus*), hvis Frugtlegemer er hvidlige, blødt kodede og har regelmæssige Porer, at Porerne Vægge med Alderen spalter eller flosser uregelmæssigt op i mere eller mindre tandformede Plader, saa Porelaget faar et *Irpex*-lignende Udseende; det er f. Eks. Tilfældet med *Tyromyces caesius*, *T. lacteus*, *T. fragilis* o. fl. Denne Udvikling fra et typisk poroidt til et irpicoidt Porelag er ganske normal for de paagældende Arter og paavirkes ikke af Frugtlegemets Stilling.

b. Artsbestemte Variationer. Endelig træffer man hos en stor Gruppe Poresvampe en saa udpræget Mangel paa Stabilitet i Hymenoforets Udvikling, at man inden for en og samme Art kan finde 2—3—4 forskellige Hymenofortyper. Disse forskellige Typer er i Almindelighed ikke forbundne ved Overgangsformer, men optræder isoleret, saaledes at een Kollektion af Frugtlegemer altid opviser et poroidt Hymenofor, en anden Kollektion viser en lamelloid Udvikling, en tredje daedaloid Udvikling o. s. v.; meget sjældent finder man inden for samme Bestand forskellige Typer.

Denne Labilitet i Hymenoforudviklingen synes saaledes at være af udpræget genotypisk Karakter og anvendes da ogsaa som et systematisk Kendemærke for en bestemt Gruppe Poresvampe, der snart opfattes som en Tribus, der benævnes *Daedaleae* (Donk 1933), snart som en Underfamilie ved Navn *Corioloideae* (Bondarzew & Singer 1941). Hertil hører Poresvampe med i Reglen eetaarige, ustilkede Frugtlegemer af læder- til korkagtig Beskaffenhed; Frugtlegemets Trama er sædvanligt lidet forskelligt fra Hymenofortramaet og gaar ganske jævnt over i Rørvæggene (trametoid Type). De vigtigste

Slægter er *Coriolus* (incl. *Pycnopus* og *Phyllodontia*), *Trametes* (incl. *Anthrodia* og *Funalia*), *Lenzites* (incl. *Gloeophyllum*), *Daedalea* (incl. *Daedaleopsis*) og *Irpex*. Hos nogle Slægter (*Coriolus* og *Trametes*) er det typiske Hymenofor udviklet i Form af regelmæssige Porer (poroidt), hos andre (*Lenzites* og *Daedalea*) i Form af labyrintisk bugtede Gange (daedaloidt) eller Lameller (lamelloidt) og hos *Irpex* normalt som tandformede Plader (irpicoidt). Medens Hymenoforet hos nogle Arter af disse Slægter optræder med ret konstant Form (*Coriolus versicolor*, *Trametes suaveolens*, *Daedalea* (*Pseudotrametes*) *gibbosa*, *Lenzites betulina*, *Irpex lacteus*), kendetegnes Hymenoforet hos andre Arter derimod ved en paafaldende Labilitet, hvad der naturligvis i høj Grad vanskeliggør deres Klassifikation. Man finder derfor de paagældende Arter henført snart til een Slægt, snart til en anden.*) Som velkendte Eksempler skal omtales følgende Arter.

Inden for *Coriolus* optræder hyppigt irpicoide Former hos Arter som *Coriolus* (*Daedalea*) *unicolor* og *C.* (*Polyporus*) *abietinus*, der er beskrevet som selvstændige Arter eller Varieteter, henholdsvis som *Phyllodontia Magnusii* Karst. (*C. unicolor* var. *irpicoides* Bres.) og *Irpex fusco-violaceus* Fr. Sidstnævnte Art betragtes af mange Forskere som en „god“ Art; den bør dog næppe opfattes som andet end en fast irpicoid Varietet. Som et yderligere Eksempel paa Variabiliteten hos *Coriolus abietinus* skal nævnes, at Forf. i U. S. A. har fundet Eksemplarer med et udpræget lamelloidt Hymenofor. De to omtalte *Coriolus*-Arter henføres i øvrigt nu ofte til egne Slægter. *Phyllodontia* (*P. unicolor*) og *Hirschioporus* (*H. abietinus*).

Hos *Trametes* (*Corioloropsis*) *trabea* er Hymenoforet udviklet snart som runde Porer (var. *trametea*), snart som uregelmæssige Lameller (var. *lenzitoidea*).

En særdeles polymorf Art er *Lenzites* (*Daedaleopsis*) *tricolor* (Bull.) Fr., der typisk har grenede, anastomoserende Lameller, men desuden optræder i Former med regelmæssige Porer (var. *trametea*)

*) Et typisk Eksempel paa, hvor stærkt den moderne Polyporacé-Systematik afviger fra den gamle, afgiver Slægten *Daedalea*. Til *Daedalea* i klassisk Opfattelse henregner vi sædvanligvis følgende 5 danske Arter: *D. confragosa*, *gibbosa*, *quercina*, *unicolor* og *Weinmanni*. En nærmere Betragtning viser dog ret hurtigt, at de paagældende Arter langt fra er kongeneriske; de henføres nutildags da ogsaa til hver sin Slægt: *D. confragosa* til *Daedaleopsis*, *D. gibbosa* til *Trametes* (eller *Pseudotrametes*), *D. unicolor* til *Coriolus* (eller *Phyllodontia*), *D. Weinmanni* til *Tyromyces*; kun *D. quercina*, der er Typearten paa *Daedalea*, forbliver i denne Slægt.

OM PLECTANIA PROTRACTA (FR.) GELIN OG P. COCCINEA (FR.) FCKL. I DANMARK.

Af N. FABRITIUS BUCHWALD

Den svenske Forsker Olov E. V. Gelin har i 1938 i Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger, Bd. X, Nr. 52, S. 194—197, publiceret en interessant Afhandling om Udbredelsen af *Plectania protracta* og *P. coccinea* i Skandinavien, hvortil der i det følgende skal fremsættes nogle supplerende Bemærkninger.

1. Til Diskussionen om Nomenklaturen af *Plectania protracta* (Fr.) Gelin. I den paagældende Afhandling gør O. Gelin opmærksom paa, at det rette Navn for denne Svamp er *Plectania protracta* (Fr.) Gelin, comb. nov. og ikke *P. hiemalis* (Nees et Bernst.) Seaver, som anført af Seaver (1928); sidstnævnte Kombination skyldes nemlig en beklagelig Fejltagelse af Seaver m. H. t. Publikationsaaret for Fries' Afhandling: Nov. Symb. Mycolog. Mant., der angives til 1855, men i Virkeligheden er 1851. I den Anledning vil jeg gerne gøre et Par Bemærkninger.

Nævnte Svamp er ejendommelig nok blevet beskrevet under tre forskellige Navne paa omtrent samme Tidspunkt, 1851—1852, nemlig følgende:

Peziza cruciata Fr., Nov. Symb. Myc. Mant., S. 229. 1851.

— *protracta* Fr., ibid., S. 230. 1851.

Microstoma hiemale Bernst., Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Natur. Cur. 23, S. 647. 1852.

Lad os først betragte sidstnævnte Navn. Af Seaver (1928) angives det, at Autorerne til *Microstoma hiemale* er Nees & Bernstein, idet han herved støtter sig paa en Afhandling af J. Milde i Botan. Zeit. 10: 208, 1852; det paagældende Nummer („12. Stück“) af Botan. Zeit. udkom 19. Marts 1852. Seaver har imidlertid ikke været opmærksom paa, at saavel Slægten *Microstoma* som Arten *M. hiemale* er publiceret alene af Bernstein i en Afhandling med Titlen: *Microstoma hiemale*, eine neue Pilzgattung

aus der Gruppe der Pezizoideen (Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Natur. Cur. 23: 647 - 656. 1852). Afhandlingen ledsages af en smuk, farvelagt Tavle, og paa Titelbladet anføres, at den er indgaaet til Akademiet 14. Oktober 1851. I Tilslutning til Bernstein's Afhandling har J. Milde sammesteds publiceret et mindre Tillæg („Mantisse“), i hvilket han giver nogle supplerende Oplysninger om Svampens Bygning.

Vi staar saaledes over for det sjældne Tilfælde, at samme Svampens navn optræder med forskellige Forfattere, nemlig:

Microstoma hiemale Bernst.

— — Nees & Bernst. (apud J. Milde).

Saavidt jeg kan se, har ingen Forfatter tidligere været opmærksom paa dette Forhold, heller ikke Heim (1926), som indgaaende har drøftet Svampens Nomenklatur. Hvem bør nu betragtes som den rette Autor til Navnet?

Ja, herom kan der næppe herske Tvivl. Arten er tydeligvis først beskrevet af Bernstein, hvis Afhandling som nævnt er indgaaet til Akademiet 14. Oktober 1851. Det paagældende 23. Bind af Akademiets Forhandlinger, hvori den tryktes, udkom imidlertid først i 1852. I Mellemtiden havde J. Milde i Nummeret for 19. Marts 1852 af Botanische Zeitung faaet optaget en Afhandling, hvori han foruden Bernstein's latinske Diagnose af *Microstoma hiemale* giver et kort Sammendrag af Bernstein's og sine egne til Akademiet indsendte Afhandlinger, men ved en Lapsus anfører han baa- de Nees og Bernstein som Autorer til Svampen.

Hvorvidt det paagældende Bind af Akademiets Forhandlinger er udkommet før 19. Marts 1852 eller først efter denne Dato, ser jeg mig ikke i Stand til at afgøre. Er Bindet publiceret før 19. Marts, ligger Sagen fuldstændig klar; i saa Tilfælde er Bernstein Svampens Autor. Men selv om Bindet først skulde være udkommet efter denne Dato, kan jeg ikke se rettere, end at Bernstein ogsaa i dette Tilfælde bør betragtes som den rette Autor, ikke Nees et Bernstein. J. Milde's Afhandling i Bot. Zeit. er nemlig tydeligvis af sekundær, nærmest referatagtig Karakter, og den Omstændighed, at Milde fejlagtigt ogsaa anfører Nees som Medautor, kan derfor ikke tillægges nogen Gyldighed. Denne Lapsus bør rettelig henføres til Kategorien Trykfejl. Det paagældende Navn bør derfor citeres:

Microstoma hiemale Bernst., Nova Acta Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 23: 647. 1852.

„Meddelelser“ nævnes 1 Lokalitet. Hertil slutter sig et i Literaturen ikke omtalt Fund, hvoraf der findes Materiale i Landbohøjskolens Svampesamling, samt et nylig gjort Fund fra Lolland (det. F. H. Møller; se dette Hefte, S. 181).

Plectania coccinea kendes saaledes fra mindst 7 forskellige danske Lokaliteter. De paagældende Lokaliteter er:

1. Jylland. Krabbesholm Skov. Leg. J. Lind & C. H. Ostensfeld (Lind 1913, S. 106).
2. Fyn. Klingstrup. 1. 1. 1878, Leg. E. Rostrup (Lind 1913, S. 106).*)
3. — Vejstrup Aaskov. Leg. E. Rostrup (Lind 1913, S. 106).
4. — Broholm, 3. 1887. Leg. H. Sehested (Lind 1913, S. 106. Materiale i Landbohøjskolens plantepatologiske Samling).
5. Møen. Nælderenden, 23. 3. 1926. Comm. G. Ebbesen. (Meddelelser“ IV, S. 8).
- — — — —, 3. 1929. Leg. Frk. V. Christensen (Materiale i Landbohøjskolens plantepatologiske Samling).
6. — Klinteskov, 8. 1. 1930. Leg. Frk. Thøgers-Sørensen (Materiale i Landbohøjskolens plantepatologiske Samling).
7. Lolland. Skovgaard, V. Ulslev, 1. 1939. Leg. Frk. Inge Lindholm; det. F. H. Møller (Friesia II, S. 181).

SUMMARY

On *Plectania protracta* (Fr.) Gelin and *P. coccinea* (Fr.) Eckl. in Denmark.

1. The nomenclature of *Plectania protracta* (Fr.) Gelin (1938) is shortly discussed. Some of the synonyms of this species are given on p. 168, among others *Microstoma hiemale* which must be cited *M. hiemale* Bernst. and not *M. hiemale* Nees & Bernst. as stated by Seaver (1928). *Plectania protracta* has not yet been found in Denmark.

*) Dette Fund er nærmere omtalt af E. Rostrup i dennes mykologiske Dagbøger.

2. *Plectania coccinea* (Fr.) Fckl. has already been mentioned by E. R o s t r u p 1869 in the Danish literature; 7 different finds are on record from Denmark (p. 170).

L I T E R A T U R

- Bernstein, A.: Microstoma hiemale, eine neue Pilzgattung aus der Gruppe der Pezizoideen. Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Natur. Cur. 23: 647—656. 1852.
- Ferdinandson, C. & Winge, O.: Mykologisk Ekskursionsflora. Kbhv. 1928.
- Fries, E.: Novarum symbolarum mycologicarum mantissa. Acta. Reg. Soc. Sci. Ups., Ser. 3, vol. 1: 225—231. 1851.
- Gelin, O. E. V.: The distribution in Scandinavia of *Plectania protracta* (Fries) Gelin, comb. nov. and *Plectania coccinea* (Scop.) Fuckel. D. kgl. Norske Videnskabers Selskabs Forh. X, Nr. 52: 194—197. 1938.
- Heim, R.: Fungi Brigantiani. Bull. Soc. Mycol. France 41: 451—457. 1926.
- Lind, J.: Danish Fungi. Kbhv. 1913.
- Milde, J.: Mantissee zur Abhandlung über *Microstoma hiemale*. Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Natur. Cur. 23: 657—658. 1852.
- Milde, J.: Ueber ein neues Pilz-Genus: *Microstoma hiemale* Nees et Bernst. Botan. Zeit. 10: 208—209. 1852.
- Møller, F. H.: *Peziza* (*Plectania*) *coccinea* (Scop.) Fr. Friesia 2: 181. 1941.
- Petersen, S.: Det højere Svampeflor. Kbhv. 1895.
- Rostrup, E.: Blomsterløse Planter. Kbhv. 1869.
- Rostrup, E.: Vejledning i den danske Flora. Anden Del. 1. Udg. 1904, 2. Udg. 1925.
- Seaver, F. J.: The North American Cup-fungi (Operculates). New York 1928.

NOTITSER



Gustav Ebbesen

13. 3. 1882 — 27. 9. 1938

I en Alder af 56 Aar er et af vore mest virksomme Provinsmedlemmer, Vinhandler G. Ebbesen, Nakskov, afgaaet ved Døden.

Ebbesen var udrustet med kunstneriske Anlæg. Han kom i Malerlære og blev en dygtig Dekorator. I sin Ungdom opholdt han sig en Aarrække i Svejts og Tyskland, og her modtog han uforglemmelige Indtryk af Naturen og plejede sine kunstneriske Interesser. Hans Fader, der var Ejer af den landskendte, hyggelige, gamle Vinkælder paa Nakskov Torv, havde paa sine gamle Dage Brug for ham, og Ebbesen nedlagde da Haandværket og boede fra nu af i sin Fødeby. Fra 1927, da Faderen døde, bestyrede han Vinkælderen for sin Moder.

Paa sine Søndagsture i Skovene paa Lolland-Falster, Langeland og i Sydsjælland fik han, som i Forvejen var en stor Beundrer af Sommerfugle og Blomster, Øje for Svampenes Skønhed. 1925 lærte jeg ham personligt at kende og fik et frugtbart Samarbejde med ham lige til hans Død. Han havde en storartet Evne til at arrangere Ekskursioner, og uanset Vejret var vi ude Søndag efter Søndag. Han malede smukke Akvareller af de sjældne Arter*) og erhvervede sig forbavsende hurtigt et udstrakt Kendskab til de højere Svampe, men han interesserede sig aldrig

*) Disse Billeder er indlemmet i Botanisk Haves Bibliotek og omfatter især mange Russula-Arter.

for Publikation af sine Fund. Hans Glæde var derimod stor, naar han fandt noget sjældent. „Nu er Dagen reddet!“ eller: „Det var hele Turen værd!“ udbød han ofte, idet han lagde sig paa Knæ for at beundre en Svamp.

Vinkælderen voldte ham noget Bryderi, især da Myndighederne lagde saa mange Baand paa Vinhandlererhvervet. Men han hentede sin Optimisme i Naturen, særligt fra 1933, da han stiftede Bekendtskab med den tyske Mykolog Julius Schäffer, med hvem han opstillede et Par nye *Russula*-Arter (se J. Schäffer: *Russula-Monographie II*, Nachtrag og Beitrag zur *Russula-Forschung*, Ann. Myc. 1937). *Russula*-Slægten med de mange farverige Arter tiltalte særligt hans Kunstnersind.

Om Vinteren syslede Ebbesen med Modellering, dekorerede sin Vinkælder eller udførte de skønneste Billedskærerarbejder.

Hans personlige Egenskaber overstrålede dog alle hans Færdigheder. Han var en trofast og gavmild Ven, opofrende i sit Hjem, ærlig og rede- lig i al sin Færd, ofte vittig, og sagde altid sin Mening lige ud. „Gustav“, som han populært kaldtes af Vennerne, vandt sig derfor overalt, saavel i Kunstnerverdenen som mellem Botanikerne, mange Venner.

Nykøbing F., 12. Januar 1941.

F. H. Møller.




Foto ca. 1930

Carl Thore Mörner
4. 8. 1864 — 7. 9. 1940

Med professor emeritus, greve, med. dr. Carl Thore Mörner bortgick en av Nordens främste storsvampkännare och originellaste forskare på mykologiens fält. Efter 1882 avlagd studentexamen inskrevs han vid Uppsala universitet, där han tio år senare promoverades till medicine doktor efter att ha disputerat på en avhandling om proteinämnena i ögats ljusbrytande medier och förordnades till docent i medicinsk kemi. Redan två år senare utnämndes han till e. o. professor i medicinsk och fysiolo-

gisk kemi och blev 1909 ordinarie professor i samma ämnen, i vilken befattning han kvarstod, tills han 1929 uppnådde emeritusåldern. Mörner var alltså ej botanist av facket. Han hade emellertid ett starkt botaniskt påbrå, i det han på mödernet härstammade från den frejdade botanist-släkten Fries: Elias Fries var hans morfar, Thore Magnus Fries hans morbror, och bland hans kusiner voro ytterligare två botanik-professorer, nämligen Robert E. Fries och Thore C. E. Fries. Än mera knuten till den Friesska släkten blev han genom sitt giftermål med kusinen Linnéa Fries, dotter till med. dr. O. Robert Fries, en son till Elias Fries och känd inom mykologien som medutgivare av det posthuma andra bandet av faderns „Icones selectae“ och som självständig forskare. Kärleken till svamparna och till „scientia amabilis“ i allmänhet följde också Mörner genom hela livet.

I sin vetenskapliga verksamhet förstod Mörner att ofta förena sina medicinskt-kemiska och sina mykologiska intressen. Redan hans första skrift (1886) var av sådan art och behandlade de högre svamparnas näringsvärde. I detta arbete, som till en början mötte skarpa gensagor men vars resultat av senare forskare bekräftats, kunde Mörner visa att tidigare svampentusiaster i högsta grad övervärderat svamparna som näringsmedel på grund av deras höga kvävehalt; i själva verket är deras halt av smältbar äggvita så låg, att de snarare äro att betrakta som njutningsmedel än som näringsmedel.

Under titeln „Om de högra svamparna. Några erfarenhetsrön“ sammanförde Mörner 1919 några uppsatser, vilka delvis tidigare publicerats i olika tidskrifter, behandlande bl. a. giftsvampar samt svamparnas lukt- och smakföreteelser. Även här förenade sig sålunda Mörners medicinskt-kemiska intressen med hans mykologiska. Hans intresse för svamparna var emellertid också av rent floristisk natur, och särskilt under senare år publicerade han en rad uppsatser om sällsyntare eller ur andra synpunkter märkliga arter, exempelvis om *Urnula Craterium*, *Mycenastrum corium* och *Tulostoma brumale* samt om *Geaster*- och *Scleroderma*-arter.

Mörners botaniska verksamhet inskränkte sig ej enbart till svamparna. En utförligare levnadsteckning över Mörner som botanist har tecknats av prof. N. Svedelius i *Svensk Botanisk Tidskrift* 35, och Mörner som medicinare har skildrats av prof. G. Blix i *Uppsala Läkareförenings förhandlingar*, N. F. 46.

Denna korta minnesteckning kan icke bättre avslutas än genom ett lån ur den förstnämnda minnesteckningen av följande karakteristik av Mörner: „Det var — skulle man kanske våga säga — rent av något linnéanskt över honom, som visade sig uti hans — läkarens och medicinforskarens — vakna allmänintresse för allt levande omkring honom, varvid otvivelaktigt växterna icke minst fångade hans intresse. Det visade sig vidare i hans store reslust — han hade ju rest jorden runt. Lägger man ytterligare därtill hans stora kärlek till och vana vid det gamla romarspråket, så kanske än ytterligare det intrycket styrktes, att han i viss mån tillhörde en annan tidsålder. — Mörner var en mycket vänsäll man, som gärna trivdes ihop med botanisterna.“

Uppsala, September 1941.

John Axel Nannfeldt.

Viktor Litschauer

1879—1939.

Den 27. December 1939 døde den kendte østrigske Mykolog Viktor Litschauer efter et langt Sygeleje, kun 60 Aar gammel. Basidiomycet-forskningen har ved hans Død mistet en fremragende Forsker.

Litschauer var i sine unge Aar Assistent hos F. von Höhnelt i Wien og gjorde allerede da sit Navn kendt ved sammen med sin Lærer

von Höhnelt at udgive en Række værdifulde Studier over *Corticium* (1906—1908), som blev af grundlæggende Betydning for Udforskningen af denne vanskelige Slægts Systematik. Allerede i 1908 udnævntes han til Professor ved Handelsakademiet i Innsbruck, i hvilken Stilling han virkede til 1936, da han paa Grund af Svagelighed maatte trække sig tilbage. I Innsbruck-Aarene kom han i livlig Forbindelse med talrige europæiske og amerikanske Mykologer, som sendte ham Materiale til Bestemmelse. Litschauer's Speciale forblev stadig de lavere Basidiomyceters Systematik, paa hvilket Felt han snart ved Siden af den franske Mykolog H. Bourdot blev den anerkendte Autoritet. Hans Publikationer fra denne Tid er dog kun forholdsvis faa, og noget større samlet Arbejde naaede han desværre aldrig at faa udgivet; han havde bl. a. Planer om Udgivelsen af en omfattende monografisk Bearbejdelse af Slægten *Tomentella*.

Litschauer var ogsaa en ivrig Samler og efterlod ved sin Død et stort mykologisk Herbarium. Han udgav et Par Ekssikkater, V. Litschauer: *Fungi tirol. exs.* og V. Litschauer & H. Lohwag: *Fungi sel. exs. europ.*

Litteratur. H. Lohwag: Viktor Litschauer zum Gedenken. *Ann. Myc.* 38: 89—91. 1940. Heri findes en fuldstændig Fortegnelse over hans mykologiske Arbejder.

N. Fabritius Buchwald.

J. E. Lange: Flora Agaricina Danica I—V. Ett mykologiskt monumentalk. Namnet Jakob E. Lange har en välkänd och mycket förnämlig klang inom den agaricinologiska litteraturen, och med rätta räknas Lange till nutidens främsta skivlingskännare. Denna ställning, som grundlades genom hans monografiskt upplagda, av kritisk skärpa och självständighet kännetecknade „Studies in the Agarics of Denmark“ i Dansk Botanisk Arkiv (1914—1938), har nu på ett lysande sätt dokumenterats och bekräfts av det under förra året fullbordade ikonografiska standardverket „Flora Agaricina Danica“. Tillkomsten av detta ståtliga planscherverk har väl i första hand möjliggjorts därav, att Lange samtidigt varit både skicklig mykolog och konstnär. Då han början av 1890-talet grep sig an med undersökningen av Danmarks skivlingflora, nöjde han sig icke med att makro- och mikroskopiskt studera och beskriva de arter, som kommo under hans ögon, utan han avbildade dem också så omsorgsfullt och naturtroget som möjligt i akvarell. I sistnämnda verksamhet nådde han snart både tekniskt och konstnärligt ett verkligt mästernivå. Så tillkommo under mer än 40 års forskningsmödor en samling (in duplo) på över 1100 svamptavlor, vilket betyder att Lange avbildat och analyserat de allra flesta av Danmarks hittills kända skivlingar, en vetenskaplig och konstnärlig prestation, som måste väcka oförställd beundran, helst som den utförts på „lediga stunder“ vid sidan av en lärarverksamhet, som särskilt under svampsäsongerna bör ha känts ganska distraherande. En dublettsats av Lange's akvareller deponerades i Botanisk Museum i Köpenhamn. Här hade jag sommaren 1932 tillfälle att närmare studera dem. Mina högt ställda förväntningar blevo därvid mer än infriade, ja, så vitt jag kan bedöma saken, äro dessa svampavbildningar i sitt slag oöverträffade. Särskilt väckte det min förvåning, att trots den minutiösa noggrannheten i detaljframställningen, de avbildade svamparnas „habitustruck“ förblevo så verklighetstroga. Kort sagt här förelåg ett bildmaterial, som om något förtjänade att reproduceras i tryck, så att det kunde komma mykologer i vidaste kretsar till godo. En sådan tanke och önskan måste ovillkorligen inställa sig hos betraktaren av dessa svampakvareller, en förhoppning, som väl också Lange och med honom dansk mykologisk forsknings många vänner och utövare sedan länge hyst. Nu är den helt uppfyllt i och med att femte och sista fascikeln av J. E. Lange's: *Flora Agaricina Danica* utkom i slutet av föregående år. Därmed är ingen-

ting mindre än ett vetenskapligt storverk på mykologiens område utfört!

Publiceringen av *Flora Agaricina Danica* började 1935 i en synnerligen förnämlig regi. För utgivningen svarade nämligen Dansk Botanisk Forening och Foreningen til Svampekundskabens Fremme. De ekonomiska förutsättningarna för planschverkets utgivande skapades i första hand genom ett frikostigt understöd från Carlsbergfonden och Rask-Ørsted-fonden på sammanlagt 70.000 danska kronor, i andra hand genom anskaffandet av en försvarlig subskribentstock, som enligt uppgift nu uppgår till omkring 200. Priset kunde därför sättas till £ 16.10 (ung. 340:—sv. Kr.), vilket med hänsyn till verkets omfång och kvalitativa förtjänster måste anses som mycket lågt.*) Givetvis har huvudvikten lagts på planschmaterialet, vid ett korrekt återgivande av de *Langeska* akvarellerna. På 200 planscher i stort kvartformat ha omkring 1200 arter och variteter av danska skivlingar reproducerats i naturliga färger. Det är just det vanskliga att i tryck riktigt få fram svamparnas många och skiftande färgnyanser, och för att lyckas därmed har man i denna ikonografi tydligen nedlagt största omsorg och ej skytt några kostnader. Den reproduktionsteknik, som kommit till användning, är en polykromlitografi med ända upp till tio färgavdrag. Resultatet måste utan överdrift betecknas som mönstergillt, reproduktionerna, som tåla att betraktas med lup, göra verkligen rättvisa åt de utmärkta originalakvarellerna. Därmed är också det högsta vitsord givet om planschverkets vetenskapliga värde. Detta omdöme torde icke någon fackman vilja eller kunna jäva. Men även för den enkle naturvannen och svampamatören bör det vara en estetisk njutning och en synnerligen lärorik sysselsättning att bläddra i *Langes* verk, det ger icke minst ett starkt intryck av hur artrik och mångformig skivlingarnas grupp i själva verket är. Den som så önskar, kan ju anställa jämförelser med bildmaterialet i andra berömda, vetenskapliga svampikonografier, exv. *Cooke's Illustrations of British Fungi* eller *Fries' Icones Hymenomycetum*, även sådana av sent datum, t. ex. *Bresadola's Iconographia mycologica* eller *Konrad & Maublanc's Icones selectae fungorum*. Man skall nog lätt finna, att *Flora Agaricina Danica* mer än väl tål vid jämförelsen. Ja, jag känner knappast något likartat verk, som kommer upp till dess bildstandard, om icke möjligen *E. Boudier's Icones mycologicae*. Svamparna i *Flora Agaricina Danica* äro återgivna i naturlig storlek, flera småarter dessutom i 2 eller 3 ggrs förstoring. De avbildade exemplaren av flera genuina barrskogsarter förefalla emellertid från svensk synvinkel sett att ha varit ganska små. En särskild eloge vill man gärna giva för den noggrannhet och skicklighet, varmed miniatyrarterne inom släktena *Lepiota*, *Mycena*, *Omphalia*, *Galeria*, *Naucoria* m. fl. och de efemära *Psathyra*- och *Coprinus*-arterne avbildats och reproducerats. Även bildmaterialet av *Inocyberna* synes mig stå på en alldeles enastående hög nivå. Det förefaller nästan, som om lilleputtarna bland skivlingarna varit föremål för *Lange's* alldeles speciella intresse, detta sagt som ett högsta beröm! En annan förtjänst hos *Flora Agaricina Danica*, som särskilt bör påpekas, är att spor-, cystid- och andra mikroskopiska karaktärer vunnit ett starkt beaktande, vilket på sitt sätt vittnar om verkets högmoderna snitt. Nästan till varje avbildad svampart hör sålunda också en teckning av sporer och cystider, och i den mån hatthudens struktur har betydelse för arternas och släktenas systematik, har detta vederbörligen anmärkts och utnyttjats i diagnoserna. Ej heller saknas uppgifter om och bilder av konfigurationen hos *Russula*- och *Lactarius*-arternas sporer, vilken ju visat sig vara viktig för artbestämningen inom dessa kritiska släkten. Skall ett sammanfattande omdöme fällas om bildmaterialet i *Flora Agaricina Danica* nödgas man använda de amplaste lovord, man får verkligen söka med ljus och lykta för att finna något att anmärka på. Men en recension bör ju innehålla någon kritik! I så fall skulle jag vilja säga, att bilderna av några få arter, t. ex. *Paxillopsis prunulus*, *Pholiota*

*) Prisen er efter Værkets Afslutning forhøjet til 400 d. Kr. Red.

flammans, *Cortinarius gentilis*, *Lactarius deliciosus* och kanske ett par till enligt min mening icke äro så lyckade och typiska som det övervägande flertalet.

Den tillhörande engelske texten — sammenlagt över 500 sidor — är typografiskt sett mycket tilltalande och, vad viktigare är, från innehållssynpunkt fullt värdig det utomordentliga bildmaterialet. Annat var ju icke heller att vänta. J. E. Lange äger förutom en ingående kännedom om skivlingarna och dem berörande litteratur också en självständig och kritisk uppfattning om dessa svampars systematik, vilket allt borgar för att textinnehållet icke blivit en vanlig kompilation, utan en högst intressant och originell framställning. Man behöver blott läsa introduktionerna till de olika släktena för att övertygas härom. Till yttermera visso har Lange som medhjälpare haft Danmarks främsta, nu verksamma mykologer, såsom C. Ferdinandsen, Ö. Winge, N. F. Buchwald, F. H. Møller, M. P. Christiansen, Poul Larsen m. fl. Beskrivningarna av de olika arterna äro icke särdeles långa och utförliga, men i gengäld synnerligen koncisa och klara. Samma goda egenskaper känneteckna artöversiktterna; sådana exakta examinationsschemata möter man alltför sällan i den agaricinologiska litteraturen. Vad släkt- och gruppindelningen beträffar intager Lange ofta en påfallande konservativ ståndpunkt och ställer sig gärna hälsosamt avvaktande gentemot de många nymodigheter, som på senare tid vuxit upp på skivlingssystematikens marker. Problem rörande vanskliga arttolkningar och synonymik behandlas kritiskt och måttfullt. I slika frågor torde väl ingen dödlig träffa det hundra procentigt riktiga. Det är emellertid många viktiga uppslag och bidrag till artsynonymiken, som Lange lämnar. Förmodligen komma de i en del fall att ställas under fackmännens debatt, men kunna aldrig helt förbigås, ty de äro ej lösa hugskott, utan alltid motiverade av saksak. Ett stort antal för vetenskapen nya arter och varieteter beskrivas i verket. Ett fullständigt register och en rik litteraturförteckning ökar dess användbarhet och värde.

Flora Agaricina Danica länder icke blott J. E. Lange och hans medhjälpare till ovanskelig heder, utan det manifesterar även den höga, gedigna ståndpunkt, som den danske botaniska forskningen av i dag intager, det visar, att de stolta traditionerna i Flora Danica hemland väl värdas. Helt säkert kommer det store intresse, som man i Danmark ägnat storsvamparnas studium, att ytterligare ökas och stärkas genom Lange's ståtliga livsverk, ja, Flora Agaricina Danica blir förvisso en klassisk urkund och en stimulans för den agaricinologiska forskningen överallt inom den civiliserade världen. Icke minst de svenska mykologerna ha anledning att vara tacksamma för Lange's förnämliga ikonografi; själv vill jag gärna bekänna, att jag redan haft den största nytta och glädje av den samma under mina blygsamma, men dock så kärvordna skivlingsstudier.

Karlstad, i november 1941.

Harry G. Svensson.

Bengt Cortin: Svampplockarens handbok. Utförlig beskrivning med 137 avbildningar. 239 pgg. Saxon & Lindströms förlag. Stockholm 1937. Der er Grund til at gøre opmærksom paa denne svenske Svampeskog. Den er forsynet med mange gode Gengivelser af Svampefotografier. Særlig interessant er Billedet af en meget sjælden Morkel, *Morchella elata*. Desuden er Bogen forsynet med Farvebilleder af 36 Svampearter, de fleste paa forskellige Alderstrin.

En faglig Bedømmelse af Bogen maa overlades til mere Svampekyndige. Forfatteren mener at indehave Rekorden som Svampespiser-Expert, idet han har spist (eller dog smagt paa — dette advares mindre kyndige imod) ikke færre end 239 Arter.

Gentofte, September 1939.

E. Dehn.

Michaels Führer für Pilzfreunde ved Br. Hennig og J. Schäffer, Bd. 1. (Quelle & Meyer, Leipzig 1939). Af dette kendte og skattede tyske Oplysningsværk om Svampe er nu 1. Bind udkommet i stærkt omarbejdet, moderniseret, ny Udgave med 106 Sider indledende Tekst og 123 smukt farvelagte Billeder, samt Beskrivelser af de vigtigste Spise- og Giftsvampe inden for de behandlede Grupper.

Den erfarne Mykolog Jul. Schäffer har leveret langt det største Bidrag til dette Bind, idet han i den indledende Tekst har behandlet den systematiske Del, forklaret Fagudtryk og givet Nøgler til de betydningsfulde eller vanskelige Slægter: *Amanita*, *Psalliota* og *Russula*, samt beskrevet alle Bladhattene (91 Arter) og dertil malet ca. 30 nye Svampebilleder, mest af *Psalliota*- og *Russula*-Arter. Til Gengæld har Hennig overtaget Udvidelsen af hele Værket og forfattet Stykkerne om Svampedyrkning, Tilberedning af Svampene og en lille interessant Oversigt over Giftsvampe, samt skrevet Teksten til Ikke-Bladhattene. Nomenklaturen følger i Hovedsagen den her i Landet gængse Tradition, og i de enkelte Tilfælde, hvor dette ikke er sket (f. Eks. hos *Psalliota*), er Synonymer anført. Billederne er paa ganske enkelte Undtagelser nær typiske og svarer godt til danske Svampe. Af Champignon-Arter er afbildet 11 med 10 nye Billeder af J. Schäffer, og et lignende Antal Slørhatte er behandlet. Der er givet gode Billeder af Giftsvampene: *Tricholoma tigrinum*, *Entoloma lividum*, *Inocybe Patouillardii*, *Boletus satanas* og *Clavaria pallida*. Endvidere maa fremhæves et nyt smukt Billede af *Boletus miniatorporus*. Beskrivelserne er fyldige, og over hver af disse er med udhævede Typer nævnt de særlige Kendetegn, og Forvekslingsmuligheder er stadig anført.

Den smukke Bog, som er trykt paa godt Papir og vil efterfølges af to andre Bind (ialt bliver over 400 Arter behandlet), fortjener stor Udbredelse, fordi den giver Underretning for Begyndere og tillige yder ligesom vore egne populære Svampebøger den viderekomne nyttige Vink. Det er glædeligt, at man kan byde Publikum Bøger af en saa høj Standard, et Vidnesbyrd om, at det Oplysningsarbejde, som Svampevidenskabens Pionerer i Aarenes Løb har udført, ikke har været forgæves.

Nykøbing F., 22. December 1940.

F. H. Møller.

Soppforeningen i Bergen. Virksomheten har siden forrige beretning (cfr. Friesia II: 84) vært fortsatt i det samme spor som tidligere. Verdensbegivenhetene har her, som andre steder, gitt det praktisk-mykologiske arbeid øket aktualitet, men p. g. a. en rekke dårlige soppar har foreningen ikke kunnet utnytte konjunktorene som ønskelig. Funn av vesentlig vitenskapelig interesse har ikke vært gjort i de senere år.

Styrets sammensetning er p. t. Husholdningslærerinne frk. Th. Grahl-Nielsen, formann; amanuensis frk. A. Karlsen, viseformann og museumsassistent frk. E. Solensteen, sekretær.

Bergen, 13. juni 1941.

Esther Solensteen.

S. S. F. Stockholms svampsällskap Friesia (SSF) fortsätter, enligt styrelseberättelserna för de senaste åren, framgångsrikt sin verksamhet och fullföljer energiskt sitt arbetsprogram: „att ur såväl botanisk som kulinarisk synpunkt främja svampintresset samt att verka för ökad kännedom om svampfloran“. Den målmedvetna svamppropaganda, som bedrivs energiskt även av andra sammanslutningar, vidare av institutioner, press och enskilda, synes ha burit rika frukter. Man kan sålunda med tillfredsställelse konstatera, att svampintresset vuxit enormt i styrka för att kulminera under nu rådande ransoneringstider samt att kunskapen om våra viktigaste mat- och giftsvampar spritt sig i allt vidare kretsar, medan

„kantarellister“ och andra nybörjare samtidigt allt mer fördjupat sina svampstudier.

Som ett talande bevis på det enormt stegrade svampintresset kan bl. a. åberopas den av S.S.F. i samarbete med Stockholms Borgarskola på hösten 1940 anordnade nya serien av svamputställningar under ledning av svampinspektör J o h. S a n d b l o m vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd och undertecknad K o c k. Publiktillströmningen vid särskilt den första utställningen i serien blev så överväldigande, att den stora utställningslokalen i Borgarskolan på några få ögonblick blev till bristningsgränsen fylld av en svamphungrande publik, medan en kö på minst ett par hundra personer aldrig kunde beredas tillträde under första dagen. Och som ett gott bevis på svampkännedomens utbredning kan nämnas, att under det senaste året (1940) som i stort sett var ett ovanligt gott svampår, in- tet enda förgiftningsfall — så vitt känt — blev inregistrerat inom hela vårt land.

Under tidigare år ha under svamparnas högsäsong liknande svamputställningar varit anordnade på Borgarskolan, alla alltid livligt besökta. Varje sådan utställning, varvid svamparna av vissa trängande skäl måst läggas på borden samt förses med både svenska och latinska släkt- och artnamn på rekordtid — allenast drygt en timme har sålunda stått de båda anordnarna (S a n d b l o m och undertecknad K o c k) till förfogande! — har i regel omfattat 100 à 150 arter. Vid de första utställningarna upplades svamparna enligt släktuppställningen i K r o k - A l m q u i s t s välkända svampflora, men på sistone har på undertecknad K o c k s initiativ anlitats ett annat system för svamparnas uppläggning. Enligt detta ha svamparna — samtidigt som alla stjärnor, gifttecken och andra krumelurer resolut strukits från namnlapparna — ordnats i tre skilda huvudgrupper: A - s v a m p a r (= alla goda matsvampar), B - s v a m p a r (= alla först efter förbehandling — avkok, urlakning m. m. — ätliga svampar) samt C - s v a m p a r (= alla giftiga, misstänkta, förkastliga och minder värddiga svampar). Denna anordning synes ha omfattats av utställningspublika med både syn- och hörbart gillande.

S.S.F:s verksamhetsår har hittills alltid inletts med en serie svampföreläsningar på Borgarskolan, där dess nu med pension avgångne rektor S v e n N i l s s o n visat stor förståelse för svampsaken. Föreläsare ha varit hr S a n d b l o m och undertecknad K o c k. Undertecknad K o c k har dessutom varje år i propagandasynfitt hållit föredrag i Radio, där man ävenledes på ledande håll hyser ett varmt svampintresse. Föredragen ha behandlat våra farligaste giftsvampar och våra bästa matsvampar, dubbelgångarna, „nybörjarsvamparna“, svamparnas näringsvärde m. m. — alltid med nya grepp på ämnet. Även ledamoten, svampexperten B e n g t C o r t i n har vid skilda tillfällen delgivit radiopubliken sin sakkunskap.

Svampexkursioner i skog och mark äro givetvis S.S.F:s mest betydelsefulla verksamhetsfält. En serie sådana exkursioner båt-, tåg- och buss- ledes anordnas både vår och höst under ledning av Sällskapets experter. Härvid har ofta samarbete etablerats med svampintresserade tidningar, nämligen med Nya Dagligt Allehanda, Svenska Dagbladet och senast med Socialdemokraten, som på sistone lagt i dagen stor förståelse för svampsaken. Däröfver vittna bl. a. många i tidningen införda goda svampartiklar och utmärkta svampintervjuer. Vidare har S.S.F. varje år anordnat livligt besökta vår- och höstfester, i regel i samband med Sällskapets vår- och höstsammanträden. Vid dessa hållas alltid mykologiskt betonade föredrag. Härom året bidrog S.S.F:s hedersledamot, den framstående mykologen E i n a r I n g e l s t r ö m med ett instruktivt svampkåseri. Vid ett annat tillfälle refererade undertecknad K o c k under rubriken „Ett svampunder“ N. F a b r i t i u s B u c h w a l d s intressanta uppsats i „Friesia“ om „Sporeproduktionens Størrelse hos Tøndersvampen, Polyporus fomentarius“. Ett stort antal tidningar i olika delar av landet publicerade flera avsnitt av detta referat. — Även vid festarna dominerar svampen. Där föredragas sålunda svampmarscher (bland dom Marcia Friesia), svampvisor och

nes, som Arten fortrinsvis findes paa kalkrig Jord. Saaledes vokser den i Moens Klinteskov nær Stengaarden, og Skrivekridtet ligger som bekendt nær Overfladen i Nysted-Eggen. Svampen vokser i det nordøstre Hjørne af Kjeld Skov. En svampeinteresseret Lærer i Nysted har forsøgt Indplantning i en anden Skov, ved Aalholm. Frk. Lindholm fandt Svampen første Gang i 1938 omtrent paa samme Tidspunkt. Efter min Erfaring viser Frugtlegerne sig lige efter Tøbrud.

Nykøbing F., Marts 1939.

F. H. Møller.

Schizophyllum commune som „hvalparasit“. Når man ser bort fra *Cordyceps militaris* og slægten *Onygena*, er der vist ingen af de danske storsvampe, der blot nogenlunde ofte træffes voksende på dyrisk væv. Det må derfor betragtes som noget af et særsyn, at endog en agaricacé kan vove sig ind på dette område.

Men ikke destomindre har den lille bladhat *Schizophyllum commune* fundet et nyt voksested på højre underkæbe af det i Zoologisk Have i København udstillede blåhvalskelet (*Balaenoptera Sibbaldii*). Man har undladt at fjerne et lag bindevæv, der er tørret ind og er noget bevoxet med mos samt på oversiden af kæben tillige med et betydeligt antal (30—40 expl.) af denne letkendelige agaricacé.*) På et så stærkt udsat sted finder man naturligvis ingen eksemplarer, der når artens maximale størrelse, men flere af de nu indtørrede individer synes dog at have været ret anseelige.

Om det muligvis er den spartanske mosvækst's tilstedeværelse, der betinger, at svampen kan gro, er det vel vanskeligt at udtale sig om, men i alle tilfælde er det et ejendommeligt syn.

København, Maj 1939.

Morten Lange.
stud. mag.

Boletus pulverulentus i Charlottenlund Skov. I Tilslutning til Skovsteds og Christiansens Meddelelser om *Boletus pulverulentus* Opat., 1836 (Sortblaanende Rørhat**)) kan jeg notere et Fund fra Begyndelsen af September 1939 paa c. 50 Eksemplarer i Charlottenlund Skov (i Udkanten af Skoven under Bøg i blød Muld, dækket af vissent Løv). Ogsaa andet Steds i Charlottenlund Skov fandtes Svampen i flere Eksemplarer. Der var paa den Tid næsten ingen andre Storsvampe fremme. Hattens Farve var lys olivengraabrun. Kallenbach (Pilze Mitteleuropas, Bind I) angiver Farven mørk kastaniebrun, men lædergul, naar Svampen vokser paa Steder bedækket af Løv. Musegnav er gule, senere brunrøde. De livlig gule Rørmundinger bliver senere olivenbrune. Sporestøvet er olivenbrunt.

Den stærke, pludselige Blaanen, som med Undtagelse af Hatkødets, er mørkere end Indigorørhattenes, er stærkest, sort-blaa, i Kødets af Stokbasis, hvor den oprindelige Farve er rød. Hat- og Stokkødet er iøvrigt citrongult, i Stok med en dybere Nuance end i Hat. Tryk paa Stokken, der gerne krummer mod Basis, giver blaasort Farve, paa Rørmundingerne mørkeblaa, senere blaasort Farve.

Hatstørrelsen var fra 4—15 cm, Stoklængden fra 3—11 cm, med en Tykkelse fra 6—25 mm. — Svampen angives som spiselig og er forskellig fra *Boletus radicans* Pers., der er bitter.

Sporerne er ofte let svungne ved Tilhæftningsstedet. Basidierne er firsporede. Cystiderne dels kølleformede, dels ten- og traadformede, kornede, ofte gulbrune.

København, September 1939.

V. Hertz.

*) Cfr. „Flora Agaricina Danica“ V, p. 89. — Svampen er senere flere Gange paavist paa Hvalskelettet, sidst i Juni 1941. Skelettet er nu fjernet.

**) se dette Hefte, S. 153 og S. 181.

Red.

Russula decolorans og *R. Velenovskyi*. Medio August 1939 fandtes i Hornbæk Plantage *Russula decolorans* Fr. i nogle Eksemplarer. Den orangeule Hat havde i Randen en lys purpurviolet Tone. Arten fandtes paa moseagtig Bund i Naaleskov nær Plantagens Udkant. Sporerne er karakteristiske, meget store med lange Pigge.

Russula Velenovskyi var sammesteds talrig i Naaledækket.

København, September 1939.

V. Hertz.

Heksering af *Clitocybe gigantea*. I „Friesia“ I: 61 omtalte jeg fra Charlottenlund Skov en Heksering af *Clitocybe gigantea* med en Periferi, som var beregnet til ca. 63 m. Det var i September 1931. I Maj 1940 besigtigede jeg atter Ringen — eller rettere dens Kendetegn (udgaaet Græs og bar Jord) paa Jordoverfladen. Maalt paa samme Maade som i 1931 har jeg anslaaet dens ydre Periferi til nu (Maj 1940) at være ca. 123 m, altsaa omtrent dobbelt saa stor som den Gang.

Ringens Radius var 1931 ca. 9 m og er nu altsaa omtrent dobbelt saa lang. Myceliets centrifugale Væxt skulde herefter for denne Svamps Vedkommende være ca. 1 m pr. Aar.

Ringen er efter 1931 ved Vejanlæg næsten halveret, men den tilbageblevne Del er endnu ret tydelig. Den yderste Del af Ringen kendes paa et ca. 1 m bredt Bælte af udgaaet Græs. Inden for denne Kres ses et omtrent ligesaa bredt Bælte bar Jord. Disse to Bælter er dog meget uregelmæssige.

København, Maj 1940.

E. Dehn.

Lett forgiftning med *Tricholoma saponaceum*. Hermed en beskrivelse av lett forgiftning med *Tricholoma saponaceum*. Undertegnede frisk, 54 aar; sykepleierske 34 aar. 15. 7. 1940 funnet rikelig mengde unge, helt feilfrie sopp i knusktørt vejr. Soppen ikke kogt, ikke skrellet, straks stekt i smør. Jeg fortærte 3 porsjoner, hjelpersken 2. Efter 4—6 timer lett kradsen i sveljet — uvel, ikke brekninger. I 24 timer ca. 8 suppetynne avføringer, hvorefter jeg restituert; hjelperske ennu slapp ytterligere 24 timer.

Soppen idag bestemt av botanikker Dr. Arboe-Høegh som *Tricholoma saponaceum*. Den er altsaa svakt giftig.

Trondheim, 14. August 1940.

Bertram Danelius,
Læge.

Svenska Svampfynd från Dalarna. Under en nära två månader lång turisttripp i Dalarna — under eftersommaren och hösten 1940 — gjorde undertecknad en del mykologiska exkursioner, dels med landsortsbefolkningen i Rättviksbygden och dels med turisterna, samt hade även en livligt besökt svamputställning i Rättviks municipalsamhälle. I nedanstående förteckning, som är avsedd för alla svampintresserade, har jag anförat den dag jag iakttog det första välutvecklade exemplaret av några av områdets viktigaste arter. Någon mera ingående avhandling tillåter nämligen inte utrymmet. Alldenstund fenologiska iakttagelser över svampar i Sverige äro få, och då vidare varje bidrag till kännedom om landets svampflora i form av lokalförteckningar har ett bestämt värde för mykogeografien, har jag velat publicera dessa mina iakttagelser i Friesia. Nordisk Mykologisk Tidsskrift.

Först och främst har jag att berätta något om flera av de märkliga arter, som jag lyckades uppspåra. Det lustigaste fyndet var en sammenygtring av den vanliga kantarellen (*Cantharellus cibarius*) på inte mindre än femton exemplar. Denna svampsiames fann jag den

nu i en Snes Aar har kendt begge disse Arter, er det ikke lykkedes mig at blive helt klar over, om Konrad har Ret eller ej. *B. calopus* vokser ved Restaurationen i Pomle, Falster, men sammesteds findes ogsaa *B. pachypus*, der plejer at have lysere Hat. *B. calopus* er ikke villig til at kaste Sporer, saa længe Rørlaget er fastvokset til Stokken, men naar dette udvikles, dannes der en lignende Kløft ved Stokken som hos *B. pachypus*, og derved nærmer den sig denne sidste Art. Endvidere har min *B. calopus* aldrig den øverste Stokdel rød, som et Par af Fries' Individer har, og Nettet er aldrig, som Billederne hos Fries viser, hvidt (men ogsaa Nettet hos *B. pachypus* er tegnet hvidt, saa denne Karakter kan der ses bort fra). Hvem kan nu i en anden Egn af Landet, hvor *B. calopus* findes, klare Forholdet til *B. pachypus*?

Nykøbing F., 1. Juli 1941.

F. H. Møller.

Cortinarius (Myxadium) elatior (Høj Slørhat) er spiselig. Om Slørhatenes kulinariske Egenskaber ved man meget lidt; oftest angives det, at de er uspiselige eller mistænkelige. Medio September 1941 modtog Foreningen imidlertid fra Ingeniør P. A. Boesgaard, Holte, en Æske Slørhatte til Bestemmelse. Han vilde gerne vide Navnet paa Svampen, da han havde spist den i adskillige Aar og syntes godt om den, ja mente, at den maatte henregnes til de bedste Spisesvampe. Det viste sig at være *Cortinarius elatior*.

Vi har saaledes i denne Art det første danske Eksempel paa, at en Slørhat udmærket godt kan spises. Formodentlig gælder noget lignende andre *Cortinarius*-Arter, navnlig inden for Underslægterne *Myxadium* og *Phlegmacium*, hvoraf mange har en mild Smag.*)

September 1941.

N. Fabritius Buchwald.

Polyporus hispidus. Foranlediget af en Oversigt i „Naturhistorisk Tidende“, 5. Aarg., H. 4. 1941: „Nyere danske Fund af Poresvampe (Polyporaceae)“ ved N. Fabritius Buchwald, hvori denne udtaler Tvivl om, at *P. hispidus* nogensinde er fundet i Danmark, føler jeg mig forpligtiget til at omtale et ældre Fund fra Falster (Bøtogaards Plantage, Birk). Skolebestyrer König Nissen, Nykøbing F. havde gennem en Elev modtaget et meget stort og smukt Frugtlegeme, som jeg ved Hjælp af Bulliard's 2 smukke Tavler (210, 493) var i Stand til at bestemme med Sikkerhed. Frugtlegemet afveg ved sin Tykkelse (6—7 cm) og ved sin livlige Farve (som Bull. Tavle 210) meget fra *P. cuticularis*, der fortrinsvis træffes paa Bøg. Det blev ikke opbevaret; paa Grund af Tykkelsen og den noget saftige Konsistens lod det sig ikke let tørre. Desværre har jeg ikke heller dateret Fundet i min Dagbog, og jeg tør kun sige, at det blev gjort omkring 1924.

Nykøbing F., Oktober 1941.

F. H. Møller.

Polyporus caesius. En Poresvamp med blaat Sporestøv. Sporestøvet hos Poresvampene (Polyporaceae s. str.) er i Reglen enten hvidt eller brunligt. En bemærkelsesværdig Undtagelse danner imidlertid *Polyporus caesius*, der har et blaaligt farvet Sporestøv, hvad der vist ikke er almindeligt kendt. Paa Foreningens Ekskursion til Færgelunden (5. 10. 1941) havde jeg Lejlighed til at iagttage en usædvanlig kraftig Nedfældning af Sporestøv paa visne Bøgeblade, der stammede fra en Gruppe Individer af denne Poresvamp. Sporestøvet var paafaldende blaat, varierende fra graablaa til skiferblaa Toner (Grayish blue green (T. XLVIII),

*) I sidste Udg. af Michaels „Führer“ (1939) anføres, at ogsaa *Myxadium mucosum*, som staar *M. collinitus* meget nær, er spiselig.

Deep bluish gray green (T. XLII) og Deep Medici Blue (T. XLVIII) hos Ridgway: Color standards and color nomenclature, 1912). Ogsaa under Mikroskopet kunde det tydeligt iagttages, at Sporerne har et blaaligt Skær.

Ejendommeligt nok omtaler kun faa Forfattere denne karakteristiske Sporefarve, saaledes Bourdot & Galzin (1928), der angiver: „Gris bleu clair ou gris ardoisé en masse“, og J. L. Lowe (1934): „Spores bluish gray in mass“.

Polyporus caesius danner sammen med *P. fragilis* Fr., *P. lacteus* Fr. og *P. tephroleucus* Fr. en karakteristisk Gruppe, der kendetegnes ved de mere eller mindre hvidlige Frugtlegemer og navnlig ved de smalle, cylindrisk krummede Sporer, som er forsynet med 2 polært stillede Olieadhaerenser og kun maaler $3-5 \times 1.25-1.5 \mu$. Frugtlegemer af *P. caesius* kan undertiden mangle enhver Antydning af blaa Farver; i saa Fald har man i Sporestøvets Farve et godt Kendetegn.

Oktober 1941.

N. Fabritius Buchwald.

Dictyophora duplicata fundet for 2. Gang i Danmark.)* Paa en Ekskursion til Hareskoven ved Bagsværd, 11. 10. 1941, fandt undertegnede et Eksempplar af Slørstinksvamp, *Dictyophora duplicata*. Det paa-gældende Frugtlegeme voksede i en tæt Rødgranbeplantning, og i umiddelbar Nærhed af Findestedet stod talrige Individuer af Alm. Stinksvamp (*Phallus impudicus*). Svampen stak ret dybt i Naaledækket, og Hekseægget maatte graves frem. Et Stykke Løvskov (Bøg) stødte op til Rødgranbevoksningen. Fremmede Træarter bemærkedes ikke i de nærmeste Omgivelser, men en grundigere Undersøgelse i saa Henseende kunde maa-ske givet et andet Resultat, i Overensstemmelse med Hypotesen om Indslæbning.

København, November 1941.

H. Stenholt Clausen,
stud. mag.

*) Cfr. dette Hefte, S. 207.

MEDDELELSER

fra

FORENINGEN TIL SVAMPEKUNDSKABENS FREMME.

GENERALFORSAMLING I 1938.

Onsdag den 23. Februar 1938, Kl. 7½ afholdtes den ordinære Generalforsamling i Botanisk Laboratoriums Auditorium, Gothersgade 140. Ca. 35 Deltagere.

Kommunelærer K. Bjørnekær valgtes til Dirigent.

1. Formanden, Professor C. Ferdinand sen aflagde derefter Beretning om det forløbne Aars Virksomhed. Ligesom Aaret 1936 var 1937 et daarligt Svampeaar. Sæsonen var meget tør; først i Oktober kom der Regn, saa Svampefloret blev sent. Der havde derfor hverken været afholdt Udstilling eller mykologisk Kongres. Af Ekskursioner havde der været en Foraarstur til Ledreborg og 4 Efteraarsture, af hvilke en havde været afholdt sammen med Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster (til Bromme Plantage og Kongebroskoven). — Udgivelsen af „Friesia“ havde hvilet for at bringe Foreningen i en bedre økonomisk Stilling. Af „Flora Agaricina Danica“ udsendtes i Februar 1937 Vol. II (Tab. 41—80, ca. 100 Sider); der var sket en Tilgang paa 13 Subskribenter, hvis Antal nu beløb sig til 168. — Antallet af Bytteforbindelser var uforandret. — Medlemsantallet var gaaet lidt tilbage (manglende Udstilling?), 355 : 31. 12. 1936 og 348 : 31. 12. 1937 (heraf 63 udenlandske Medlemmer), idet der var gaaet 27 ud og kommet 20 ind. Professor I. Hannover, som havde staaet i Foreningen i mange Aar, og Ingeniør André, var døde.

2. Kassereren, Amanuensis N. F. Buchwald, forelagde derpaa Regnskabet, der balancerede med Kr. 1712,89. Kassebeholdningen var pr. 31. 12. 1937 Kr. 225,01 og Bogtrykkergeelden pr. 31. 12. 1937 kun 347,25 Kr. En saa fortrinlig Status har Foreningen ikke haft i mange Aar. — Regnskabet godkendtes.

3. De 3 afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Professor C. Ferdinand sen, Ingeniør P. M. Wilkens og Professor Ø. Winge samt Suppleanten, Kaptajn M. P. Christiansen genvalgte enstemmigt.

4. Den afgaaende Revisor, Skattefuldmægtig K. Rankov, genvalgte enstemmigt.

5. Drøftelse af Ekskursioner i 1938. Der stilledes Forslag om en Foraarstur til Boserup, Efteraarstur til Høje Sande ved Rørvig og en Langtur til Sverige (Majenfors). Bestyrelsen vilde i Aar prøve at lægge den første Efteraarstur lige efter Sommerferiens Afslutning (21. August).

6. Eventuelt. Postmester I. P. Jensen foreslog at oprette en Læsekreds for de mere interesserede Medlemmer, der skulde have de udenlandske mykologiske Tidsskrifter, som Foreningen modtog i Bytte for „Friesia“, til Hjemlaan. Bestyrelsen lovede at tage Forslaget op til Overvejelse, men helt gratis kunde Læsekredsen ikke blive for Medlemmerne.

(sign.) K. Bjørnekær.

Efter Generalforsamlingen holdt Formanden, Professor C. Ferdinand sen Foredrag om: Honningsvampen (*Armillaria mellea*) og Skovbruget.

Efter Foredraget samledes godt 25 Medlemmer til et fornøjeligt Samvær paa „Café de la Reine“.

Red.

EKSKURSIONER I 1938.

Søndag den 8. Maj. Ekskursion til Boserup Skov. 35 Deltagere. Ekskursionen forløb paa sædvanlig Maade. Skønt Solen skinnede, var Vejret blæsende og koldt, hvad der mærkedes føleligt paa Spadsereturen ud til Boserup. Paa Vejtræer af *Acer pseudoplatanus* iagttoges *Polyporus squamosus* og *P. connatus*; den sidstnævnte Poresvamp synes ikke tidligere i Danmark at være bemærket paa denne Vært. Slaaenbuskene stod i fuldt Flor, hvad der lovede et godt Morcheludbytte. Der samledes da ogsaa ikke saa faa Morkler (*Morchella esculenta*) og enkelte Hættemorkler (*M. rimosipes*). Af andre Storsvampe fandtes kun *Coprinus atramentarius*, *Entoloma clypeatum* samt en lille *Hypholoma* (an *H. Candolleianum?*).

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 21. August. Ekskursion til Hareskov og Jonstrup Vang. 25 Deltagere. Efter Ankomst til Skovbrynet St. Kl. ca. 10 spadserede man gennem Store Hareskov til Pavillonen, hvor Frokosten indtoges ved 12-Tiden. Derefter gennemkrydsedes Ll. Hareskov og den nordlige Del af Jonstrup Vang. Hjemrejsen fandt Sted fra Hareskov St. Kl. 16,46.

Perioden 20/7—15/8 havde været varm og tør; først efter Midten af August kom lidt Regn, som dog ikke var tilstrækkelig til at lokke nogen righoldig Svampeflora frem. Der noteredes ialt kun ca. 60 Storsvampearter, af hvilke de dominerende var: *Collybia dryophila*, *Marasmius peronatus* og *Phallus impudicus*, som alle fandtes adskillige Steder. Antallet af *Boletus*- og *Russula*-Arter var usædvanligt ringe, kun eet Eksempel af *Boletus miniatorporus* og ganske enkelte Individer af *Russula adusta*, *cyanoxantha*, *fellea* og *violeipes*. Af Spisesvampe fandtes blot *Hydnum repandum*, *Russula cyanoxantha*, *Pholiota mutabilis* og *Psalliota arvensis silvicola*.

Blandt Fundene i St. Hareskov kan nævnes følgende: *Amanita vaginata fulva*, *Bolbitius vitellinus* langs Vejrand, Slimsvampen *Ceratiomyxa fruticosa* et Par Steder paa Rødgranstød, *Collybia fusipes* flere Steder under Eg og *Stereum bicolor* paa nedfaldne Bøgegrene.

En særlig interessant Lokalitet var en stor, gammel Savsmuldsdyng, bestaaende af en Blanding af Bøge-, Ege- og Rødgransavsmuld, der laa nær Pavillonen. Her fandtes et yppigt Flor af *Collybia fusipes*, *Mutinus caninus* og *Pluteus cervinus* samt de to Slimsvampe, *Fuligo septica* og *Lycogala epidendron*.

I Ll. Hareskov og Jonstrup Vang iagttoges bl. a. *Hypholoma Can-dolleianum*, *Lentinus cochleatus*, *Mycena pelianthina*, *Polyporus giganteus* flere Steder paa Bøgestød, *P. squamosus* paa frønnet Askestamme, *P. tephroleucus* paa nedfaldne Bøgegrene, *Psathyra conopioleia* i Grøft og *Ustulina maxima*, der dækkede en gammel Bøgeruin op til en Højde af 6—7 m.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 4. September. Ekskursion til Majenfors (ved Markaryd) i Sverige. Ca. 35 Deltagere.

Paa Udvejen foretoges under et kortvarigt Ophold lidt før Åstorp en Afsøgning af et Terræn, væsentlig bevokset med Gran. Her fandtes et Eksempel af *Schizophyllum alneum* paa Birk; ellers saa godt som intet. I Majenfors deltes Medlemmerne i to Hold, og med Frk. Neumann og Hr. Dehn som Vejvisere afsøgte ialt 4 Omraader.

Det mykologiske Udbytte var ringe; kun ca. 45 Arter fastsloges, mange kun i Enkelteksemplarer, og ret meget mere var der tilsyneladende heller ikke fremme. Det lykkedes dog at faa samlet temmelig mange *Boletus edulis* og *Cantharellus cibarius*, saa i kulinarisk Henseende blev det en god Tur. Det vigtigste botaniske Resultat var ubetinget Paavisningen af *Schizophyllum alneum* her paa Grænsen mellem Skaane og Halland.

Turen var overmaade smuk, men for lang og anstrengende til een Dag.

Nedenfor følger en Liste over de vigtigste Fund:

Amanita porphyrea, *vaginata* var. *fulva*; *Annellaria semiglobata*; *Boletus bovinus*, *pachypus*, *piperatus*, *versipellis*; *Clitopilus prunulus*; *Cortinarius armillatus*, *semisanguineus*; *Gomphidius viscidus*; *Lactarius vellereus*; *Lenzites betulina*, *saepiaria*; *Marasmius scorodoni*; *Mycena zephira*; *Pholiota flammans*; *Polyporus perennis*; *Russula graminicolor*, *lepida*, *vesca*; *Schizophyllum alneum*; *Stropharia coronilla*.

K. B j ø r n e k æ r.

Søndag den 18. September. Ekskursion til R ø r v i g. 31 Deltagere. I lejet Turistbil startede Selskabet Kl. 8 fra Søtorvet ved Café de la Reine til Hundested, hvor Bilen efterlodes. Turen fortsattes med Færgen over til Rørvig, hvorfra man spadserede over „Højesande“ til „Rørvig Bad“, hvor Frokosten indtoges ved 12-Tiden. Om Eftermiddagen gennemkrydsedes Sandflugtsskoven, med en Afstikker ud til Stranden ved Kattegat. Efter en Kaffepause paa Rørvig Hotel fandt Hjemrejsen Sted fra Rørvig Kl. 18; til København naaede man godt Kl. 20. Ekskursionen begunstigedes af Tørvejre hele Dagen.

Svampefloraen var særlig rig og interessant paa den navnlig med Fyr og Birk bevoksede Indlandsklit „Højesande“. Det vrimlede her med mange Fluesvampe (*Amanita mappa*, *muscaria*, *pantherina*, *porphyrea* og *rubescens*) og Rørhatte (*Boletus bovinus*, *edulis*, *luteus*, *variegatus*). Af mere bemærkelsesværdige Fund kan nævnes: *Cortinarius vibratilis*, *Gomphidius roseus*, *Hydnum auriscalpium*, *Inocybe Bongardii*, *Mycena pura* med lilla Stok og lys Hat, *Otidea leporina*, *Stropharia coronilla*, *Tricholoma flavobrunneum* og *T.gambosum*.

Sandflugtsplantagen var langt fattigere paa Arter. Den overalt dominerende Art var her *Boletus variegatus*; andre hyppige Svampe var *Lactarius rufus* og *Russula vinosa*. Endvidere fandtes *Exidia*

saccharina paa døde Grene af Bjergfyr og den meget sjældne *Prægtig Skørhat* (*Russula elatior*, Syn. *R. paludosa*).

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 9. Oktober Ekskursion til Gelskov. Ca. 40 Deltagere. Gennem Gelsskov til Ørholm, hvor Frokosten spistes, og tilbage gennem Ravneholm og Gelskov til Holte St., hvorfra Hjemrejse. Daarligt Vejr med Regn paa en stor Del af Turen, men godt Humør. Svampefloret var ringe. Forholdsvis mange *Clitocybe nebularis*, kun faa *Tricholoma nudum*.

Særlige Fund: *Boletus pulverulentus*, nogle Eksemplarer i Ravneholm; *Hebeloma mesophaeum*, *H. longicaudum*, et smukt Eksemlar; *Mycena pseudopura**) (leg. M. P. Christiansen); *Polyporus borealis*, *P. hirsutus*, flere Individer; *Tricholoma vaccinum* i Gelskov; *Volvaria gloiocephala*, Eksemplarer med blyfarvet Hat og riflet Rand ved Høstak ved Ravneholm.

V. Hertz.

GENERALFORSAMLING I 1939.

Lørdag den 25. Februar 1939, Kl. 7½ afholdtes den ordinære Generalforsamling i Botanisk Laboratoriums Auditorium, Gothersgade 140. Ca. 40 Deltagere.

Kommunelærer K. Bjørnekær valgtes til Dirigent.

1. Formanden, Professor C. Ferdinandsen aflagde Beretning om det forløbne Aars Virksomhed. Ligesom i de foregaaende to Aar 1937 og 1936 havde Svampesæsonen i 1938 i sin Helhed ogsaa været daarlig, hvad der stod i Forbindelse med en Tørkeperiode fra ca. 20. Juli til ca. 15. August. Der havde derfor hverken været afholdt Udstilling eller Kongres. Af Ekskursioner havde der været den traditionelle Tur til Boserup Skov (35 Deltagere) og 4 Efteraarsture, af hvilke to havde været Langture (Rørvig og Majenfors i Sverige). — Af „Friesia“ blev der udgivet et meget stort Hefte (138 Sider), der faktisk er at betragte som et Dobbelthefte, samt Indholdsfortegnelse og to Registre til Bd. I. — Vol. III (Tavle 81—120 og ca. 100 Tryksider) af „Flora Agaricina Danica“ udkom i Marts 1938; der var nu 181 Subskribenter, hvilket vil sige en Tilgang paa 13 i Løbet af 1938. — Antallet af Bytteforbindelser var uforandret. — Medlemstallet var ogsaa i Aar gaaet noget tilbage (manglende Ud-

*) ubeskrevet Art.

stilling?), 348 Medlemmer : 31. 12. 1937 og 331 : 31. 12. 1938, idet der var gaaet 36 Medlemmer ud (heraf ikke færre end 18 slettet paa Grund af Restance) og indmeldt 19. I Aarets Løb var følgende 5 Medlemmer døde: Professor C. Raunkjær, Adjunkt P. Larsen, Dr. T. Manicus, cand. pharm. Thousing (Holbæk) og Vinhandler G. Ebbesen; over de tre førstnævnte findes Nekrologer i „Friesia“, Bd. II, Hefte 1; over den sidstnævnte er optaget en Nekrolog i nærværende Hefte.

2. Kassereren, Amanuensis N. F. Buchwald, forelagde derpaa Regnskabet, som balancerede med Kr. 1363.46. Kassebeholdningen var pr. 31. 12. 1938 Kr. 398.77. Der var ingen Gæld, da Regningen fra Bogtrykkeren for Bd. II, Hefte 1 af „Friesia“ først forelaa i Januar 1939. — Regnskabet godkendtes.

3. De fire afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Amanuensis N. F. Buchwald, Læge V. Hertz, Landsdommer K. Mundt og Kommunalærer F. H. Møller samt Suppleanten, Kommunalærer K. Bjørnekær genvalgtes enstemmigt.

4. Den afgaaende Revisor, Skattefuldmægtig K. Rankov, genvalgtes enstemmigt.

5. Lovændringen til § 2 vedtoges enstemmigt; se dette Hefte S. 201.

6. Under Drøftelsen af Ekskursionerne i 1939 fremsattes Forslag om Ekskursioner til følgende Steder: Petersværft-Skovene (sammen med Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster); Nordskoven ved Jægerspris; Romele Klint i Skaane.

7. Eventuelt. Dirigenten rettede en Tak til Formanden, Professor C. Ferdinandsen, der lige var fyldt 60, og Næstformanden Læge V. Hertz, som lige var fyldt 70, for deres store og udmærkede Arbejde for Foreningen.

(sign.) K. Bjørnekær.

Efter Generalforsamlingen talte Kommunalærer F. H. Møller, Nykøbing Falster, om mykologiske Indtryk fra sin Rejse til Færøerne i Sommeren 1938, hvortil Carlsbergfondet havde ydet Understøttelse. Et kort Referat af Foredraget findes i „Naturhistorisk Tidende“ III: 38—39. 1939.

Omkring 35 af Deltagerne deltog derefter i en fornøjelig Sammenkomst paa „Café de la Reine“.

Red.

EKSKURSIONER I 1939.

Søndag den 14. Maj. Ekskursion til Boserup Skov. 30 Deltagere. Turen havde det traditionelle Forløb. Man spadserede gennem Klosterhaven, over Sct. Jørgensbjerg og videre ad Stien, der fører over Bistrupgaards Enge. Paa de gamle Rødel, som vokser langs Stien, noteredes flere Steder den støvboldlignende Slimsvamp *Reticularia lycoperdon*, og i et Slaaenkrat fandtes *Polyporus fulvus*. Inden Frokost foretog man den sædvanlige Morkelafsøgning i Terrænet omkring Pavillonen. Udbyttet blev meget ringe; ialt blev der næppe samlet mere end en Snes ret smaa, men regelmæssige, typisk „rundhovede“ Eksemplarer af Spisemorklen (*Morchella esculenta*), samt en enkelt Hættemorkel (*M. rimosipes*). Efter Frokost gik man ned til Stranden, hvor Forlagsboghandler P. H. Hagerup filmede Deltagerne. Trods ivrig Eftersøgning fandtes der ingen Vaar-musseroner (*Tricholoma gambosum*) og iøvrigt ingen Agaricaeer; derimod bemærkedes et Par friske Individer af *Polyporus brumalis*. Det fattige Svampeflor hang utvivlsomt sammen med det kolde og usædvanligt tørre Foraar; der var i de sidste 3 Uger ikke faldet en Regndraabe i Københavns Omegn.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 27. August. Ekskursion til Storskoven ved Hvalsø. 25 Deltagere. Man tog med Toget fra København Kl. 8,27 og ankom til Hvalsø Kl. 9,34. Den medbragte Frokost indtoges i Skoven ved Skovridergaarden. Efter Eftermiddagskaffe paa Hotel „Hvalsø“ fandt Hjemrejsen Sted Kl. 16,53; i København Kl. 17,59.

De sidste 14 Dages Tørke havde ikke undladt at sætte sit Præg paa Svampefloraen, der haade arts- og individmæssigt var fattig og i det hele gjorde et noget fortørret Indtryk. Der fandtes dog en Del Spisesvampe: *Amanita rubescens*, *Cantharellus cibarius* (adskillige store Eksemplarer), *Hydnum repandum*, *Lactarius volemus* (et Par Individer), *Psalliota arvensis silvicola* og *Russula cyanoxantha*.

Den interessanteste Lokalitet var nogle Grøfter langs Hovedvejen i Storskoven, fyldt med gammelt, delvis formuldet Savsmuld. Her florerede en yppig og særpræget Savsmuldfloa, bestaaende af følgende 7 Arter:

1. *Collybia platyphylla*, en noget aggregat, tyk- og kortstokket Form med mørkebrun Hat.

2. *Fuligo septica* i alle Udviklingsstadier, fra smørgule Plasmodier til udbredte, kageagtige Ætalier (20-30 cm i Diameter), der efter Alderen varierede stærkt i Farve, fra smudsigt hvidlige over blegbrune til gulbrune og rødbrune Farvetoner.

3. *Phallus impudicus*, talrige Hekseæg, mere eller mindre dybt begravede i Savsmulden.

4. *Pleurotus petaloides* (forma *aggregata* f. n.), en selskabeligt optrædende Form, der een Gang tidligere er fundet paa Savsmuld (se Flora Agaricina Danica II: 70-71); karakteristisk for Arten er de talrige, grove, tenformede Cystider.

5. *Pluteus cervinus*, talrige Eksemplarer af den sædvanlige sodbrune Form.

6. *Pluteus petasatus*, adskillige store, i Smaaklynger voksende Individer med baade Hat og Stok hvidlige-blege. Denne Art synes udelukkende at være knyttet til Savsmuld og kan derfor paa Dansk kaldes Savsmuld-Skærmmhat.

7. *Pluteus cinereo-fuscus* Lange, med graa, rynket, puklet Hat. De fundne Eksemplarer svarede ganske til Lange's Beskrivelse (F. A. D. II: 86-87).

Som det vil bemærkes, minder denne Savsmuldfloa i sin Artsammensætning en Del om en tilsvarende, mindre artsrig Floa, som fandtes paa en Savsmulddyngre paa Ekskursionen til Hareskov 21.8. 1938 (se dette Hefte S. 190).

Af andre Fund kan følgende nævnes: *Amanita phalloides*, et Par Steder paa god Muldbund under Bøg (*A. mappa* fandtes karakteristisk nok intetsteds i Skoven); *Boletus erythropus*, enkelte Individer, *B. luridus* flere Steder; *Collybia platyphylla*, højstokket, lys Form; *Hypocrea gelatinosa*, talrige Stromata paa trøsket Bøgeved; *Mycena crocata* paa Bøgepinde; *Polyporus frondosus* omkring Eg, den sjældne *P. umbellatus*, hvoraf der dog kun fandtes de karakteristiske Sklerotier omkring et Bøgestød; *Psalliota silvatica* (Syn. *P. sanguinaria*); *Russula aurora*, *R. virescens*, *R. Velenovskyi* (det. V. Hertz). — Endelig fortjener det at nævnes, at Knopcellesvampen *Libertella faginea* iagttoges i usædvanlig stor Mængde paa Brændestabler af Bøg.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 10. September. Ekskursion til Tisvilde Hegn. 17 Deltagere. I Følge den udsendte Ekskursionsplan skulde Turen oprindelig være gaaet til Romele Klint i Skaane, men paa Grund af

dell har taget den med i den gode Oversigt over *Clavaria*-Slægten, som han har udarbejdet til Krok & Almqvist's Flora.

F. H. Møller.

Søndag den 24. September. Ekskursion til Færgelunden og Jægerspris Nordskov. Turen, der var planlagt som en Biltur, maatte aflyses paa Grund af Benzinrestriktionerne.

Søndag den 8. Oktober. Ekskursion til Krogenberg og Nyrup Hegn. 16 Deltagere. Efter Ankomst til Kvistgaard spadserede det lille Selskab — efter en lille Afstikker til Danstrup Hegn — gennem Krogenberg Hegn til Marianelund Kro, hvor Frokosten indtoges. Derpaa fortsattes Turen gennem Nyrup Hegn tilbage til Kvistgaard, hvorfra Hjemrejse ved 16-Tiden.

Oktober Maanedes større Luftfugtighed havde lokket en Del flere Svampe frem end paa de foregaaende Ekskursioner i denne Sæson, men alligevel maatte Svampefloret dog som Helhed betegnes som fattigt, baade i Bøge- og Granskoven. Rigest paa Svampe var nogle smalle, græsklædte, i Øst-Vest løbende Skovveje i Krogenberg Hegn, aabenbart som Følge af den her herskende større Skygge og derfor større Fugtighed. En efter Forholdene særlig rig Lokalitet var en fugtig, med Blade opfyldt i Øst-Vest gaaende Grøft; her fandtes talrige Individer af følgende Arter: *Boletus elegans*, *Clitocybe odora*, *Inocybe geophylla*, *Mycena pura* og *Lycoperdon gemmatum*.

Den dominerende Svamp var utvivlsomt *Boletus elegans*, som praktisk talt voksede overalt, hvor der fandtes Lærk, navnlig i Nyrup Hegn; der samledes flere Kurve fulde. I det hele taget fandtes der mange *Boleter*, saaledes *Boletus edulis* (en Del deformerede Eksemplarer), *B.miniatoporus*, *B.piperatus*, *B.scaber* og *B.subtomentosus*. Af Spisesvampe samledes iøvrigt enkelte *Cantharellus cibarius* og *Psalliota arvensis silvicola*.

I Krogenberg Hegn opsøgte den paa en tidligere Ekskursion (22. 9. 1935) opdagede Lokalitet med Brandtomter, som kendetegnedes ved en egen Flora af „kulelskende“ Svampe (se Friesia I: 330, 1936). Her genfandtes pletvis talrige Eksemplarer af *Collybia ambusta* (Tran-Fladhæt) og endvidere enkelte Individer af *Flammula carbonaria* (Kul-Flammehæt); derimod eftersøgte de tidligere fundne *Rhizina inflata* og *Peziza (Geopyxis) carbonaria* forgæves.

Af andre Fund i Krogenberg Hegn kan nævnes: *Clavaria stricta* paa Bøgepinde; *Gomphidius viscidus*; *Hebeloma mesophaeum*; *Hypocrea citrina*, der omkring et Bøgestød dannede store Kager, inkrusterende Blade, Pinde og Jord; *Polyporus albidus* paa *Larix europaea*, vist ny dansk Vært for denne Poresvamp, *P. betulinus* og *P. fomentarius*, begge paa samme Birkestamme.

Fra Nyrup Hegn noteredes bl. a. *Leptonia placida*; *Pholiota caperata*; *Tricholoma brevipes* samt følgende Slørhatte: *Cortinarius anomalus*, *collinitus*, *elator*, *hinnuleus*, *multiformis* og *semisanguineus*.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 15. Oktober. Ekskursion til Jægersborg Dyrehave og Bøllemosen. En Snes Deltagere samledes Kl. 10 ved Sporvejens Endestation i Klampenborg, hvorfra man spadserede gennem Dyrehaven ad Fortunvejen til P. Lieps Hus og herfra Nord paa over Eremitagesletten til Strandmøllekroen. Her indtoges Frokosten Kl. ca. 12,30, hvorpaa Turen gik videre gennem Jægersborg Hegn til Bøllemosen. Hjemrejsen skete fra Skodsborg Kl. 16,11.

Vejret var tørt under hele Ekskursionen, men noget køligt. Trods det sene Tidspunkt noteredes omkring 45 Storsvampearter; Individantallet var dog ikke stort. Af mere bemærkelsesværdige Fund i Dyrehaven kan nævnes: *Inocybe scabra*; en Koloni af *Pholiota VahlII*, der voksede sammen med *Coprinus comatus* nær Fortunvejen; *Polyporus fomentarius* i Toppen af en endnu levende *Acer pseudoplatanus* ved P. Lieps Hus, og *P. fuliginosus* paa trøsket Bøgestød.

I Jægersborg Hegn iagttoges bl. a. *Amanita phalloides* og *Cortinarius malachius*. Omkring Bøllemosen: *Cortinarius flexipes*, *Flammula penetrans*, *Lactarius glyciosmus*, *L. helvus*, *Marasmius lupuletorum*, *Omphalia setipes*, *Pluteus cervinus* paa Birkestød og *Polyporus cupreo-laccatus* paa gammel Bøgestamme. De hagllignende Skleerotier af *Cenococcum geophilum* fandtes flere Steder under Mostuer.

N. Fabritius Buchwald.

GENERALFORSAMLING I 1940.

Onsdag den 28. Februar 1940, Kl. 19,30 afholdtes den ordinære Generalforsamling i Botanisk Laboratoriums Auditorium, Gothersgade 140.

ning, der bekræftedes ved en Ekskursion nogle Dage senere, i hvilken Ref. deltog; paa denne fandtes henved et halvt Hundrede Morkler.

Af andre Svampe noteredes følgende: *Chlorosplenium aeruginosum* med Apotecier paa nedfalden Bøgepind; *Collybia velutipes*, et Knippe paa Bøgestød; en lille *Hypholoma*-Art (an *Candolleianum*?); *Polyporus connatus* paa *Acer pseudoplatanus* ved Landevejen ud til Boserup, *P.squamosus* paa Ælmestød i Klosterhaven. Af *Sclerotinia tuberosa*, der angriber Rhizomer af *Anemone nemorosa*, fandtes Bægerfrugter flere Steder.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 1. September. Ekskursion til Køge Strandskov og Skovene ved Vallø. 40 Deltagere. Med Toget til Køge (Ankomst Kl. 9,39), hvorfra man spadserede ud til Strandengene Syd for Køge og derfra gennem Strandskoven. Efter Frokost paa Køge Strandhotel ved 12-Tiden fortsattes Turen til Vallø-Skovene: Pramskov, Purlund og Vallø Dyrehave. Hjemrejsen foregik fra Vallø St. Kl. 16,40; Ankomst til København Kl. 18,25.

Regnen var strømmet ned næsten hver Dag i den foregaaende Uge, og i det hele taget havde August været meget regnrig; selve Ekskursionsdagen bød dog paa Tørvejr og Solskin. Den megen Fugtighed havde lokket et rigt Svampeflor frem, langt rigere end sædvanligt saa tidligt paa Sæsonen, navnlig naar man ser tilbage paa de 3 sidste magre Svampeaar (1937—1939). Ekskursionens Udbytte blev ca. 160 Storsvampearter.

Paa Strandengene fandtes bl. a. *Lepiota excoriata* og *Lycoperdon hiemale*; megen Opsigt vakte en Bevoksning paa over Hundrede Eksemplarer af den store, hvidlige Skærmhat, *Pluteus petasatus*, der er knyttet til Savsmuld; ved nærmere Eftersyn viste det sig da ogsaa, at der paa det paagældende Sted i Strandengen var henkastet Savsmuld, som nu var halvformuldet.

I Køge Strandskov, der overvejende bestaar af Skovfyr, iblandet Birk, Bøg, Eg og andre Løvtræer, noteredes: *Amanita vaginata fulva*; *Boletus felleus*, *luteus* (talrige Individer), *scaber*, *variegatus*; *Cantharellus cibarius*, hvorefter der samledes flere Kurve fulde; *Cortinarius bolaris*; *Flammula penetrans*; *Hydnum auriscalpium*; *Lactarius camphoratus*, *vietus*; *Lepiota granulosa*, *setulosa*; *Lycoperdon caelatum*; *Polyporus perennis* i meget store Eksemplarer; *Tricholoma flavobrunneum*, *nudum* (adskillige Individer), *sulphureum*.

Fra Pramskov og Purlund, der væsentlig er Bøgeskove, kan nævnes: *Amanita phalloides*; *Boletus erythropus*, *miniatoporus*, *strobilaceus*; *Craterellus cornucopioides*; *Lactarius fuliginosus*, *pal-lidus*; *Lepiota alba*, *albosericea*, *carcharias*, *clypeolaria*, *cristata*; *Marasmius lupuletorum*; *Mycena crocata*; *Omphalia fibula*, *graveolens*; *Pholiota caperata*, *erebia*; *Pluteus rigens*; *Psalliota arvensis silvicola*, der dannede Hekseringe i Bøgeløvet, *haemorrhoidaria*; *Psathyra conopilea*; *Polyporus giganteus* (Bøgestød); *Russula alutacea*, *atropurpurea*, *puellaris*, *Quéletii*; *Scleroderma bovista*; *Tricholoma fumosum*.

I Vallø Dyrehave tiltrak især nogle fugtige Græsstrækninger sig Opmærksomheden; her iagttoges bl. a.: *Clavaria amethystina*, smukke, violetfarvede Eksemplarer, *cinera*; *Hygrophorus ceraceus*, *miniatus*, *pratensis*; *Leptonia lampropus*, *serratula*; *Peziza macropus*; *Tricholoma brevipes*.

Endvidere fandtes i Dyrehaven: *Lactarius cyathula* under *Alnus*; *Lepiota acutesquamosa*; *Otidea leporina*; *Polyporus cupreo-laccatus* og *P. fomentarius* paa gamle Bøge.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 8. September. Ekskursion til Ravnsholt Hegn. Skønt det regnede det meste af Lørdag Nat, og Vejret saa truende ud om Morgen, fik Ekskursionen alligevel en meget stor Tilslutning (45 Deltagere), og hele Turen forløb i Tørvejr. Fra Farum St. (Ankomst 9,19) spaserede man ad Bregnerød-Vejen til Lille Ravnsholt Hegn, som gennemsøgte før Frokost. Denne blev indtaget paa Bregnerød Kro, hvor ogsaa Formiddagens Udbytte demonstreredes. Man vandrede derefter gennem Ravnsholt Hegn til Lillerød, hvorfra Hjemrejsen skete Kl. 16,31.

Svampeudbyttet blev udsædvanligt stort, ialt 172 Storsvampe; saa mange Arter er ikke blevet samlet i adskillige Aar paa Foreningens Ekskursioner. Ogsaa Høsten af Spisesvampe var ud over det sædvanlige; talrige Kurve fyldtes med alle Slags spiselige Svampe, især Rørhatte. De absolut dominerende Arter var *Boletus subtomentosus*, *Clitocybe laccata*, *Paxillus involutus* (lave Partier) og *Russula ochroleuca*. Af Pladshensyn maa Omtalen indskrænkes til de vigtigste Fund.

Lille Ravnsholt: *Amanita excelsa*, *Lactarius fuliginosus*, *Merulius tremellosus* og *Stereum bicolor* paa Bøgestød.

Ravnsholt Hegn: *Amanita spissa*; *Boletus miniatoporus*, *versipellis*; *Clitocybe metachroa*; *Cortinarius anomalus* (Gulfnug-

get Slørhat), *cinero-violaceus* (Violetgraa S.), *collinitus*, *cyanopus* (Blaastokket S.), *sulphureus* (Svovlgul S.), *triumphans* (Gulbæltet S.)*); *Crucibulum vulgare* paa Sækkelærred; *Cyathus striatus*; *Flammula alnicola*; *Hebeloma sinapizans*; *Helvella elastica*; *Lepiota cristata* i Mængde langs Skovvej, *lenticularis*; *Limacium chrysodon*, *olivaceo-album*, *penarium*; *Oligoporus ustilaginoïdes*, som flere Steder dannede udbredte, tottede, brune Puder paa Rødgranstød; *Omphalia stellata*; *Peziza aurantia* paa Skovvej i store Klynger, hvori enkelte Frugtlegemer havde en Diameter paa over 20 cm; *Polyporus hirsutus* paa Bøgegrene, *odoratus*, flere anselige Eksemplarer paa gammelt Rødgranstød, *ungulatus* paa Skovfyr; *Psathyrella disseminata*; *Reticularia lycoperdon*; *Thelephora palmata* paa Skovvej; *Tricholoma ustale*.

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 15. September. Ekskursion til Herlufsholm-Skoven. Fællestur med Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster, hvis Medlemmer om Formiddagen under Ledelse af Konsulent P. Grøntved og Lektor J. Ferdinand undersøgte Raadmandshaven (langs Susaaens venstre Bred). Her noteredes 114 Storsvampe. Mange Parasolsvampe fandtes i de fugtige Askemoser, f. Eks. *Lepiota echinella*, *fulvella*, *fusco-vinacea*, *haemosperma*, *Hetieri* og *hispida*. Af mindre kendte Arter kan endnu nævnes: *Boletus pulverulentus*; *Clitocybe obsoleta* (sensu Lange); *Cortinarius fulgens* (sensu Lange), *hinnuleus*, *paleaceus*; *Geopyxis cupularis*; *Marasmius globularis*, *candidus*, *fuscopurpureus*, *lupuletorum*; *Nolanea icterina*; *Pholiota brunneola*, *filaris*; *Pluteus nanus* var. *lutescens*; *Russula laurocerasi*, *venosa*; *Tricholoma irinum*.

En lille teglstensfarvet Parasolsvamp med spidse Hatskæl som hos *Lepiota echinella*, men ellers i andre Henseender meget lig *L. rufescens*, er foreløbig ubestemt. Den blev fundet paa samme Vokseplads for 18 Aar siden og er nævnt i „Friesia“ Bd. 1, p. 32.

Ved 12-Tiden blev Frokosten indtaget i Kaffehuset, hvortil Københavnerne imidlertid var ankommet. Her forevistes en stor, gul, randskægget Mælkehat, der bliver violet ved Berøring. Den var Dagen før plukket i Virket Lyng paa Falster og hedder *Lactarius repraesentaneus* Britz.

*) Alle *Cortinarius*-Arterne er bestemt af Dr. V. Hertz; i Parentes er vedføjet Forslag til danske Navne.

Under Førerskab af Lektor Ferdinand gik derefter Deltagerne gennem Kohaven og Friheden i en sydgaaende Bue tilbage til Skolen, hvor man i Museet besaa en Svampeudstilling, arrangeret af Disciplene, og bagefter foreviste Lektoren den botaniske Have og Skolehaven, hvori findes mange sjældne og interessante Planter, f. Eks. Gyvelkvæleren med Hestebønne som Vært. Af Eftermiddagens Udbytte kan nævnes: *Cortinarius cristallinus*, *Flammula apicrea* (sensu Lange), *Lepiota Bucknallii*, *Marasmius cohaerens*, *Mycena parabolica*, *Psatyrella squamifera*, *Russula atropurpurea*, *Stereum fuscum* og *Tricholoma irinum*, ialt 118 Storsvampe. — Naar alle Arter fra Formiddagen og Eftermiddagen sammenregnes, bliver det samlede Antal ca. 200.

Vejret var smukt hele Dagen, og Turen havde god Tilslutning, ialt vel c. 50 Deltagere, hvoriblandt Jakob E. Lange.

F. H. Møller.

Søndag den 29. September. Ekskursion til Gelskov. Efter Indbydelse deltog ogsaa Medlemmer af Botanisk Forening i denne Ekskursion. Deltagelsen fra begge Foreninger var meget stor, saaledes at det samlede Antal af Deltagere maa anslaaes til ca. 100, hvilket maa betegnes som Rekord i Foreningens Historie. Skønt det havde regnet meget de to foregaaende Dage, begunstigedes Turen af godt Vejr.

Fra Virum St. (Ankomst 10,22) spadserede man først gennem den sydlige Del af Gelskov til Ørholm Restaurant, hvor Frokosten indtoges ved 12-Tiden. Efter denne gik Turen tilbage gennem den nordlige Del af Gelskov til Holte St., hvorfra Hjemrejsen fandt Sted ved 16-Tiden.

Som det vil fremgaa af Beretningerne for de foregaaende Ekskursioner i dette Efteraar, var Svampefloraen paa disse usædvanlig rig; trods det noget sene Tidspunkt paa Sæsonen blev Udbyttet i Gelskov ogsaa særdeles stort. Antallet af fundne Storsvampearter beløb sig til ialt 171. De vigtigste Fund var følgende:

Amanita porphyrea; *Boletus piperatus* (et Eks. med Hatdiameter 7 cm), *B. miniatorporus*; *Clavaria abietina*, der bliver grøn ved Tryk, *C. ochraceo-viridis*, som ikke anløber grønlig; *Clitocybe conglobata*, *C. nebularis* (et Individ med Hatdiameter 28 cm); *Collybia rancida* (Mel-Fladhat); *Cortinarius caninus*, *C. decipiens*, *C. decoloratus*, *C. obtusus*, *C. rigidus*, *C. tophaceus*; *Geoglossum glabrum*; *Gomphidius viscidus*; *Hebeloma mesophaeum* (alm); *Hydnum auriscalpium*;

Hygrophorus hypothejus, *H. penarius*, *H. psittacinus*, *H. pustulatus*; *Hypholoma melantinum*; *Inocybe flocculosa*, *I. rhodiola*; *Leotia lubrica*; *Lepiota seminuda*; *Merulius tremellosus*; *Mycena elegans* (Saffranegget Huesvamp), *M. inclinata* (Egestød), *M. rorida* (Slimstokket Huesvamp); *Oligoporus ustilaginoides* (Syn. *Ptychogaster albus*); *Pholiota flammans*; *Pleurotus mitis*; *Polyporus giganteus*; *Russula atropurpurea*, *R. Quéletii*, *R. parazurea* (Blaagraa Skørhat); *Sparassis crispa*; *Thelephora palmata*, flere Steder; *Tricholoma myomyces*, *T. saponaceum*, *T. ustale* (Sveden Ridderhat).

N. Fabritius Buchwald.

Søndag den 13. Oktober. Ekskursion til Ermelunden og Jægersborg Dyrehave. Ca. 50 Deltagere, den største Tilslutning paa nogen Dyrehaveekskursion. Man mødtes Kl. 10,00 ved Linie 15's Endestation (ved „Posemandens Hus“), hvorfra man drog gennem Ermelunden til Fortunen. Her indtoges Frokosten, og Formiddagens Svampefund diskuteredes. Turen fortsattes saa videre gennem Dyrehaven, over Eremitagesletten til Springforbi St., hvorfra Hjemrejsen foregik dels Kl. 15,45, dels Kl. 16,45.

I Betragtning af det sene Tidspunkt var Svampefloret endnu rigt, og man fik saaledes kun yderligere befæstet det Indtryk, de foregaaende Ekskursioner havde givet, nemlig at Sæsonen 1940 var et udpræget Svampeaar. Der noteredes ialt 135 Arter, hvoraf 90, altsaa $\frac{2}{3}$, var Agaricaceer, et Tal, der langt overgaar, hvad man har fundet paa en Dyrehavetur i de foregaaende Aar, hvad nedenstaaende Oversigt viser:

1939, 15. Oktober (Dyrehaven og Bøllemosen): 45 Arter.

1938: ingen Ekskursion.

1937: ingen Ekskursion.

1936, 18. Oktober (Ermelunden): 17 Arter.

1935: ingen Ekskursion.

1934, 14. Oktober (Ermelunden og Dyrehaven): 75 Arter.

Det bør dog tilføjes, at selv om Artsantallet var højt, var Individantallet ikke særlig stort. Paafaldende var endvidere den store Fattigdom paa *Amanita*- og *Boletus*-Arter, idet der kun noteredes *Amanita vaginata* og *Boletus subtomentosus*. *Mycena*-Arterne var derimod ret godt repræsenterede, med over en halv Snes, hvad der vel hænger sammen med disse spæde Formers Krav til stor Luftfugtighed. Af Spisesvampe fandtes ikke mange Arter: en Del Høst-

musseroner (*Tricholoma nudum*), Taage-Tragthatte, en Del Skov-Mandelchampignoner (*Psalliota arvensis silvicola*), Foldhatte (*Helvella crispa*) og Støvbolde *Lycoperdon gemmatum* og *L. pirinum*); Honningsvampen var stærkt paa Retur. Blandt de mere bemærkelsesværdige Fund skal nævnes følgende:

Ermelunden: *Chlorosplenium aeruginosum* med Apotecier (Bøg); *Polyporus hirsutus*, talrige Eksemplarer paa levende Bøg. Paa afdrevet Askebund i dyb Muld fandtes de to sjældne Arter, *Geaster fornicatus* og *Lepiota fusco-vinacea*, begge i adskillige og vel udviklede Eksemplarer; sammesteds noteredes *Geaster triplex*, der tidligere er fundet i Ermelunden.

Ekskursionens mest interessante Fund var *Dictyophora duplicata* (leg. Civilingeniør E. Brockmeyer), en Stinksvamp, der i alle Dele ligner den almindelige *Phallus impudicus*, hvorfra den dog let skelnes ved et inden for Hatten anbragt netformet Slør, som hænger klokkeformet ned omkring Stokken; paa Dansk kan Svampen passende kaldes Slør-Stinksvamp. Trods ivrig Eftersøgning fandtes kun eet Individ, der voksede under Bøg. Arten hører oprindelig hjemme i Nordamerika og er først i de senere Aar paavist i Mellemeuropa, navnlig i Tyskland. Ermelundfundet er det første Fund i Skandinavien.*)

Dyrehaven: *Clavaria pistillaris*, *rugosa*; *Marasmius ramealis*; *Phlebia aurantiaca*; *Polyporus applanatus* og *Stereum spadiceum*, alle tre Arter paa samme Egestød.

Eremitagesletten: Her var det navnlig de mange Vokshat-Arter, som fangede Opmærksomheden: *Hygrophorus ceraceus*, *miniatus*, *niveus*, *pratensis*, *psittacinus* og *puniceus*. Endvidere fandtes *Marasmius oreades* i store Eksemplarer, *scorodonius*; *Bovista nigrescens*, og paa Hjortegødning *Panaeolus campanulatus* og *Stropharia semiglobata* var. *stercoraria*.

N. Fabritius Buchwald.

MYKOLOGISK KONGRES I KØGE 26. SEPTEMBER 1940.

Paa Viceinspektør, Kaptajn M. P. Christiansens Initiativ udgik der i Efteraaret Indbydelse til en snævrere Kreds til en mykologisk Kongres i Køge d. 20/9 40. Paa Grund af Kongefestlighederne

*) Se endvidere Naturhistorisk Tidende 5: 60—63. 1941 og dette Hefte S. 187.

meldte flere Forfald, og der mødte af fremmede kun Postmester I. P. J e n s e n, Ordrup og undertegnede.

Om Formiddagen blev Strandskoven med Overdrev og Billesborg Indelukke undersøgt. Her fandtes bl. andet: *Cantharellus muscigenus*, *Clavaria corniculata*, *Collybia murina*, *Omphalia Luffii* Massee og *Tricholoma panaeolum* (alle paa Strandoverdrevet), endvidere *Russula sanguinea* (Strandskoven) og *Mycena rorida* (2-sporet) i Indelukket under Gran.

Om Eftermiddagen gik Turen til Lellinge Skov, hvor man under Gran noterede: *Clitocybe inornata*, *Clitocybe fusco-squamula* og en for Danmark ny Køllesvamp, *Clavaria gracilis* Pers, der vist som Regel hidtil har været bestemt som *Cl. Kunzei*, forudsat Fundet er gjort i Naaleskov. Denne sidste Art har jeg oftest taget under Ask i Græs. *Cl. gracilis* har tydelig Anislugt og kan derfor passende kaldes Anis-Køllesvamp. Samme Art konstaterede jeg i Fjor paa Svampeekskursionen til Kallehave i Viemose Skov, ogsaa under Gran. *)

Vi fortsatte til Lellinge Aadal (Skovhus Vænge), en Lokalitet, som er særlig rig paa Sjældenheder. Her kunde Christensen vise os: *Armillaria irrorata*, *Collybia ventricosa* var. *subaequalis* (under Tordenskræppe), *Inocybe griseo-lilacina*, *I. incarnata*, *Lima-cium pudorinum*, *Marasmius foetidus*, *Trametes mollis*, *Tricholoma Columbetta* o. m. a.

Hr. M. P. Christensen havde Dagen før indsamlet mange Arter, saaledes fra Karlstrup Strand *Tricholoma sudum* og *Gomphidius roseus*, samt fra Solrød *Polyporus fuliginosus* (Scop.) Fr. (det. Buchwald). Postmesteren medbragte fra Ordrup bl. a.: *Camarophyllus fornicatus lacmus* og *ovinus*, *Hebeloma spoliatum*, *Mycena lasiosperma*, *Pholiota lucifera* og *Tricholoma cuneifolium*. Fra Nykøbing F. medtoges *Cortinarius talus* og *Pluteus nanus* var. *lutescens*.

Hr. og Fru Christensen gjorde Dagen festlig for os, og de mange Svampearter gav os fuldt op at bestille. I Tilgift fik vi set det ejendommelige Bøgenonneangreb i Lellingskovene.

F. H. Møller.

*) Se dette Hefte S. 197.

FORENINGEN TIL SVAMPEKUNDSKABENS FREMME

MEDLEMSFORTEGNELSE DEN 1. NOVEMBER 1941

a. Danmark.

- Abildgren, Carla, Afdelings-Sygeplejerske, Afd. C II, Kbhv. Amtssygehus, Hellerup.
- Abrahamsen, V. K., Kommunalærer, Fortunvej 56, Charlottenlund.
- Agersnap, Karen, Frk., Sølvgade 20, Kbhv. K.
- Andersen, Fru Skibsfører, Birkholmsvej 5, Lyngby.
- Andersen, Esther, Assistent, Frk., Henrik Ibsensvej 6², Kbhv. V.
- Andersen, M. K., Fru Dommer, Fabritius Allé 15, Klampenborg.
- Anderson, Oluf, fhv. Kontorbestyrer, Marievej 19², Hellerup.
- Andresen, A. M., Fru Ingeniør, Strandboulevard 137³, Kbhv. Ø.
- Ankergreen, Anna, Frue, Ny Østergade 23³, Kbhv. K.
- Asmussen, Frk., Norasvej 38, Charlottenlund.
- Backe, Ellen, Malerinde, Frk., Jernbanevej 45, Lyngby.
- Baltzer, Vilh., Inspektør, cand. mag., Mariendalsvej 94 St., Kbhv. F.
- Baltzersen, Agnes, Frk., Suensonsgade 53³, Kbhv. K.
- Baltzersen, Ella, Frk., Suensonsgade 53³, Kbhv. K.
- Bang, Anna, Frue, Hyldegaards Tværvvej 10A, Charlottenlund.
- Bang, Harriet, cand. pharm., Frk., Upsalagade 5⁵, Kbhv. Ø.
- Bang, H. de, Orlogskaptajn, Skolebakken 13, Gentofte.
- Barkhuus, W., Direktør, Forchhammersvej 23, Kbhv. V.
- Begtrup, Erik, Dr. med., Steenwinkelsvej 12, V.
- Begtrup, Frue, Steenwinkelsvej 12, V.
- Bengtsson, Gerda, Fjordsallé 9 St., Kbhv. V.

Bentzen, E. M., Frk., C. L. Ibsensvej 36, Gentofte.
 Benzon, Tove, Frue, „Bjerget“, Vedbæk.
 Biblioteket for Silkeborg og Omegn, Silkeborg.
 Bing, Kaj, Direktør, Ingeniør, Brodersens Allé 9, Hellerup.
 Bing, Ludvig, Overretssagfører, Jens Kofoedsgade 1, Kbhv. K.
 Bing, Ludvig, Frue, Jens Kofoedsgade 1, Kbhv. K.
 Bjørnekær, K., Kommunalærer, Ved Klosteret 25⁴, Kbhv. Ø.
 Bjørner, Bue, Grosserer, Akselborg, Vesterbrogade 4a, Kbhv. V.
 Blæsberg, Ida, Korrespondent, Frk., Frederiksborggade 20, Kbhv. K.
 Bolting, Sophie, Fru Maskininspektør, Refshaleøen, Kbhv. K.
 Bolwig, Ida, Frue, Ved Lindevangen 18⁵, Kbhv. F.
 Bolwig, Niels, Magister, Ved Lindevangen 18⁵, Kbhv. F.
 Boye, S., Fru Civilingeniør, Buddingevej 19 B, Lyngby.
 Bregnhøj-Larsen, J. E., Tandlæge, Nedre Hornbæk pr. Randers.
 Brink, Aage, Saxhøjvej 24, Valby.
 Brockmeyer, E., Civilingeniør, Mariendalsvej 35, Kbhv. F.
 Buchwald, N. B., fhv. Stationsforstander, Jægerhytten, Langaa.
 Buchwald, N. F., Amanuensis, cand. mag., P. Bangsvej 59⁴, Kbhv. F.
 Bülow, E. von, Tandlæge, Ordrupvej 55 B¹, Charlottenlund.
 Bülow, E. von, Frue, Ordrupvej 55 B¹, Charlottenlund.
 Bülow, Kjeld, stud. med., Kildegaardsvej 83, Hellerup.
 Bülow, S., Tømremester, Søvej 35, Holte.
 Bøggild, G. J. C., Apoteker, Bjerringbro.
 Centralbiblioteket for Maribo Amt, Nykøbing Falster.
 Christensen, Ingeborg, Frk., Rebekkavej 55⁴, Hellerup.
 Christensen, Karen, Apoteker, Frue, Gislev, Fyn.
 Christensen, Knud, Lærer, Kathrinebjergvej 54, Aarhus.
 Christensen, Miss, Frue, Madvigs Allé 5, Kbhv. V.
 Christensen, T. C., Fru Skibsreder, Skovmindevej 37, Holte.
 Christensen, Valdemar, Sproglærer, Knabstrupvej 29, Brh.
 Christensen, Vilhelmine, Frk., Hotel „Harmonien“, Nakskov.
 Christiansen, Chr., Arkitekt, Oliebladsgade 5, Kbhv. S.
 Christiansen, M. P., Kaptajn, Viceskoleinspektør, Aagade 4, Køge.
 Christoffersen, Jonna, Frue, Frederiksborggade 48, Kbhv. K.
 Cohrt, Agda, Frue, A. F. Beyersvej 20, Lejlighed Nr. 9, Kbhv. F.
 Cridland, A., Driftsbestyrer, Assens.
 Dahlgreen, H., Tandlæge, cand. pharm., Vesterport, Kbhv. V.
 Dalborg, G., Tandlæge, Nordre Frihavnsgade 27², Kbhv. Ø.
 Dalborg, Frue, Nordre Frihavnsgade 27², Kbhv. Ø.
 Dam, R., Bankbestyrer, Hortensiavej 5¹, Kbhv. V.

- Danø, S., Frk., Prinsessegade 21, Kbhv. K.
- Degett, J. A., Overtoldassistent, Dalgasvej 2, Fredericia.
- Dehn, E., Fuldmægtig, cand. polit., Ærenprisvej 29, Gentofte.
- Deurs, I. A. van, Civilingeniør, Sofievej 31, Hellerup.
- Deurs, Birgit van, Frue, Sofievej 31, Hellerup.
- Drinkwater, Jill, Frk., Engelsklærerinde, Strandboulevard 14, Kbhv. Ø.
- Dyhr, Svend, Islandsvej 2 C, Lyngby.
- Egebo, Erna, Frk., Madvigs Allé 16², Kbhv. V.
- Ejbye, Fru Poul, Ordrup Jagtvej 73, Charlottenlund.
- Eldahl, A., Reservelæge, Dr. med., Bispebjerg Hospital, Kbhv. NV.
- Elleby, K., Sognepræst, Holeby, Lolland.
- Erup, Otto, cand. pharm., De danske Spritfabrikker, Slagelse.
- Faber, Børge, Overlæge, Dr. med., Ringstedgade, Næstved.
- Falck, Ferd., Dr., Rebekkavej 57, Hellerup.
- Falck, Kirsten, Frue, Strandboulevard 13, Kbhv. Ø.
- Feddersen, Tage, Overlæge, Tranegaardsvej 67, Hellerup.
- Ferdinand, Johs., Lektor, Herlufsholm, Næstved.
- Ferdinandsen, Aage, Direktør, Strandvej 349, Klampenborg.
- Ferdinandsen, C., Professor, Dr. phil., Frederikkevej 1, Hellerup.
- Ferdinandsen, A., Frue, Frederikkevej 1, Hellerup.
- Ferdinandsen, P., Vekselerer, Nybrogade 16, Kbhv. K.
- Flint, Martha, Kontorassistent, Frk., Strandvej 59², Kbhv. Ø.
- Foged, G., Lærer, Mariagervej 58, Randers.
- Fogtmann, K. A., Frk., Dalgas Boulevard 1², Vær. 213, Kbhv. F.
- Foreningen for Naturkundskab, Viborg.
- Franck, Sofus, fhv. Skoledirektør, Falkoner Allé 114 B, Kbhv. F.
- Frandsen, N. O., Landbrugskandidat, Smørumnedre pr. Maaløv.
- Frederiksen, Henry, Konsulent, Danmarksgade 23A, Frederikshavn.
- Frederiksen, V., Malermester, Aavej 1, Roskilde.
- Freitag, Siegfride, Frue, Skjoldsgade 7, Kbhv. Ø.
- Friis, Bodil, Frue, Pilevej 2, Hillerød.
- Funch-Lassen, Ellen, Malerinde, Frue, Dalgas Boulevard 1⁴, Kbhv. F.
- Fuss, W., Forretningsmand, Mariendalsvej 32 D., Kbhv. F.
- Gabrielsen, E. K., Dr. phil., Rolighedsvej 23, Kbhv. V.
- Gad, Ida, Frue, Frederiksberg Bredegade 2 A⁴, Kbhv. F.
- Gammelgaard, Frk., Kildegaardsvej 12, Hellerup.
- Gertz, Peter, Stationsvej 6, Rungsted Kyst.
- Gertz, Juliane, Frue, Stationsvej 6, Rungsted Kyst.
- Gjermansen, W., Bellmannsgade 20³, Kbhv. Ø.

- Gjermansen, A., Frue, Bellmannsgade 20³, Kbhv. Ø.
 Glavind, Grethe, Tandlæge, Frk., P. Bangsvej 141¹, Kbhv. F.
 Goldstein, H., Frue, Annasvej 32, Hellerup.
 Goltermann, Elly, Frk., Lyngbyvej 315, Gentofte.
 Gram, Ernst, Forstander, Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby.
 Grøntved, P., Konsulent, Sydsjællands Planteavlssudvalg, Næstved.
 Gunst, Henri, Direktør, Reventlowsgade 10³, Kbhv. V.
 Hagerup, P. H., Boghandler, Chr. Wintersvej 19, Kbhv. V.
 Hallager, J., Frk., Sortedamsdossering 25², Kbhv. N.
 Hammeris, Anna, Frue, Borups Allé 137², Kbhv. N.
 Hammersholt, P., fhv. Kapelmester, Ulrikkenborgvej 106 D St. th.,
 Lyngby.
 Hammersholt, E., Frue, Ulrikkenborgvej 106 D St. th., Lyngby.
 Hannover, Knud, Direktør, Callisensvej 38, Hellerup.
 Hannover, Else, Frue, Callisensvej 38, Hellerup.
 Hansen, Agnes, Frue, Thorsensvej 48, Nykøbing Falster.
 Hansen, Erik Bille, stud. mag., Valby Langgade 215¹, Valby.
 Hansen, Gerda, Lærerinde, Frk., Strandvej 130², Hellerup.
 Hansen, Grethe, stud. med., Frk., Ved Sønderport 25 St., Kbhv. S.
 Hansen, Gurli, Kontorist, Frk., Avedørelejren, Glostrup.
 Hansen, Henning, Fru Ingeniør, Duevej 92¹, Kbhv. F.
 Hansen, Henning P., Dr. agro, Thorstedlund, Græse pr. Frederiks-
 sund.
 Hansen, H. R., Sekretær, Ellegaardsvej 25, Gentofte.
 Hansen, Karina Windfeld, Frue, Prinsesse Alexandrines Allé 8³,
 Charlottenlund.
 Hansen, Margrethe, Frk., Sotoften 9, Gentofte.
 Hansen, Marie, Overjordemoder, Frue, Frbg. Hospital, Kbhv. F.
 Hansen, William, Direktør, Østerbrogade 4¹, Kbhv. Ø.
 Hansen-Piil, M., Grosserer, Slotsvænget 3, Slagelse.
 Harhoff, P. C., Underdirektør, Sortedamsdossering 95B, Kbhv. Ø.
 Harmsen, L., Konsulent, cand. mag., Brødvej 10, Gentofte.
 Hartz, Christine, Frk., Dagvej 10, Hellerup.
 Hassing, O., Civilingeniør, Hellerupvej 51 C, Hellerup.
 Hassing, Else, Frue, Hellerupvej 51 C, Hellerup.
 Heilbuth, Anna, Frue, Trondhjemsplads 4, Kbhv. Ø.
 Hellmers, E., Havebrugskandidat, Nymindevej 15, Vanløse.
 Henningsen, Poula, Frue, Slotsparken 41, Bagsværd.
 Henrichsen, Collet, A., Frue, Frederiksberg Allé 58, Kbhv. V.

- Henrichsen, Jonny, Sygeplejerske, Frk., Fødeafdeling B, Rigshospitalet, Kbhv. Ø.
- Henriksen, K., Heliogravør, Stormgade 12, Kbhv. K.
- Henssel, E., Frue, „Majken“, St. Magleby, Amager.
- Henssel, B., Frk., „Majken“, St. Magleby, Amager.
- Hermansen, A., Maskinmester, Rasmus Rasksvej 2⁴, Valby.
- Hermannsen, H. A., Overassistent i Postv., Hasselvej 2², Lyngby.
- Hertz, Aksel, Ingeniør, Henrik Hertzvej 13, Charlottenlund.
- Hertz, E., Bogtrykker, Frue, Bogtrykkergaarden, Kbhv. S.
- Hertz, Irma, Frue, Lundsgade 4, Kbhv. Ø
- Hertz, Steffen, Ingeniør, Ordrupvej 14², Charlottenlund.
- Hertz, V., Øjenlæge, Skjoldsgade 11, Kbhv. Ø.
- Hestehave, R., Malermester, Thorup pr. Dyssekilde.
- Heyman, P. M., Revisor, Vestre Boulevard 25, Kbhv. V.
- Heyman, Ebba, Frue, Vestre Boulevard 25, Kbhv. V.
- Holm, Hakon, Digter, Bernstorffsvej 148, Hellerup.
- Holm, Hakon, Frue, Bernstorffsvej 148, Hellerup.
- Holm, Svend, Sølvsmed, Ndr. Frihavnsgade 67¹, Kbhv. Ø.
- Holm-Sørensen, A., Frue, Camilla Nielsensvej 30⁴, Kbhv. F.
- Holstebro, Helga, Fru Ingeniør, Krogvej 8, Holte.
- Holten, J., Ingeniør, Krogvej 22, Holte.
- Holten, J., Frue, Krogvej 22, Holte.
- Holten, Ellis, Frk., Krogvej 22, Holte.
- Horsens Centralbibliotek, Kildegade 28, Horsens.
- Højby, H. R., Direktør, Hørfabrikken, Grenaa.
- Højgaard, Erling, Kunstmaler, Kildebakkegaardsallé 209, Buddinge pr. Søborg.
- Høst & Søn, Boghandler, Bredgade 35, Kbhv. K.
- Høvring, Helge, cand. mag., Isafjordsgade 7², Kbhv. S.
- Høy, Anne Margrete, Frk., Ringstedgade 2, Næstved.
- Iversen, P., Prokurist, Sortedamsdossering 25 St., Kbhv. N.
- Iversen, Karen, Frk., Sortedamsdossering 25 St., Kbhv. N.
- Jacobsen, Børge, Mag. agro., Trinderup Hovedgaard pr. Onsild.
- Jacobsen, Hugo, Fru Sagfører, Puggaardsgade 11 St., Kbhv. V.
- Jahnsen, A., Frk., Sveigaardsvej 20¹, Hellerup.
- Jakobsen, Anna, Apoteker, cand. pharm., Frk., Hals.
- Jensen, C., Ingeniør, Falkoner Allé 19⁴, Kbhv. F.
- Jensen, Christen, Maskinpasser, Strandhavevej 51, Valby.
- Jensen, Claudia S., Frue, Adilsvej 11¹ tv., Kbhv. F.
- Jensen, Gudmund, Frue, Jernbaneallé 13, Taastrup.

- Mundt, H., Arkitekt, Strandvej 13, Sønderborg.
 Mundt, K., Landsdommer, Halls Allé 10, Kbhv. V.
 Mundt, A. M., Frue, Halls Allé 10, Kbhv. V.
 Mundt, Jørgen, stud. jur., Halls Allé 10, Kbhv. V.
 Munk, Anders, stud. mag., Mozartsvej 3³, Kbhv. V.
 Munkvad, G., Lystrupvej 14, Brønshøj.
 Munkvad, R., Frk., Lystrupvej 14, Brønshøj.
 Muxoll, fhv. Kommunelærer, Duntzfeldts Allé 19², Hellerup.
 Müllen, Hanne von, Frk., Hillerødgade 77, Kbhv. N.
 Müllen, Henning von, Assistent v. Skattedirektoratet,
 Nakskovvej 75, Valby.
 Müller, D., Professor, Dr. phil, Dosseringen 48, Kbhv. N.
 Münster, Lajla, Frk., Grønbakken 11, Vanløse.
 Møller, Carl Mar., Professor, Rolighedsvej 23, Kbhv. V.
 Møller, F. H., Lærer, Vesterskovvej 66, Nykøbing Falster.
 Mørke, Rasmus, Gartner, Taarnby pr. Kastrup, Amager.
 Nathansohn, N., Frk., Østerbrogade 85¹, Ø.
 Naturhistorisk Forening for Lolland Falster, Nykøbing Falster.
 Neerborg, O. V., Prokurist, Lyngbyvej 343 B, Gentofte.
 Neergaard, Paul, Forsøgsleder, mag. agro.,
 Gothersgade 158⁵, Kbhv. K.
 Neumann, G., Frk., Brandes Allé 10³, Kbhv. V.
 Neumann, G. W., Forstander, Jydsk Laboratorium, Aalborg.
 Nicolaisen, Erik, Tømmerhandler, Ordrupvej 151, Charlottenlund.
 Nielsen, Caroline, Kommunelærerinde, Vespervej 44¹, Hellerup.
 Nielsen, Edvard, Vestervoldgade 9B⁴, Kbhv. V.
 Nielsen, Gerhard, Toldkasserer, Helsingør.
 Nielsen, Kai Werner, Seminarieelev, Borups Allé 188¹, Kbhv. NV.
 Nielsen, Niels, Dr. phil., Ved Lindevangen 6¹, Kbhv. F.
 Nielsen, N. Juul, Kontorchef, Rødbyvej 60, Nakskov.
 Nielsen, O., Konsulent, mag. agro., Skovbrynet 36, Lyngby.
 Nielsen, V. Kjærulf, Kommunelærerinde, Frue, Hvidkildevej 28,
 Kbhv. F.
 Nilou, Henning, Civilingeniør, Kirstinedalsvej 18, Valby.
 Nilsson, Ebba, Frue, Bøgevej 44, Hellerup.
 Nygaard, G., Adjunkt, Søndre Landevej 10, Sønderborg.
 Nyholm-Poulsen, Karen, Kommunelærerinde, Frk., Hostrups
 Have 23³, Kbhv. V.
 Olesen, O. J., Mag. agro., Sophiehøj pr. Rødby.
 Ollendorff, Ebba, Frk., Drosselvej 81², Kbhv. F.

- Olsen, Agnete, Frk., Buntmagervej 6¹, Kbhv. NV.
 Olsen, C. V., Lyshøj Allé 5, Valby.
 Olsen, Carlo, Frederikssundsvej 127 E², Brønshøj.
 Olsen, Fritz, Skomagermester, Lindegaardsvej 2, Charlottenlund.
 Olsen, Iben, Fru Fuldmægtig, Gudenaavej 11, Kbhv. F.
 Olsen, J., Læge, Nykøbing Falster.
 Olsen, Jens, Assistent, Søborghus Park 1⁴, Søborg.
 Olsen, Karen Lilly, Bogholderske, Frk., Monrads Allé 3, Valby.
 Olsen, Werner, Bestyrer, Mylius Erichsens Allé 31, Hellerup .
 Olsen, Werner, Frue, Mylius Erichsens Allé 31, Hellerup.
 Oppenhagen, Christine, Frk., Bjørnsonsvej 42, Kbhv. Valby.
 Oppenhagen, Ellen Margrethe, Frk., Bjørnsonsvej 42, Kbhv. Valby.
 Ostenfeld-Birk, Lilli, Frue, Sundvænget 10, Charlottenlund.
 Otkjær, Harald, Disponent, Prins Constantinsvej 7, Kbhv. F.
 Paludan, O., Planteskoleejer, Klarskov.
 Pedersen, Agnes, Toftegaards Allé 26³, Valby.
 Pedersen, A. S., Varmemester, Rolighedsvej 23, Kbhv. V.
 Petersen, A. S., Frk., Langes Vej 23, Hillerød.
 Petersen, C. F., Laboratoriebetjent, Rolighedsvej 23, Kbhv. V.
 Petersen, Haagen, Inspektør, Bjerpegade 28 B, Helsingør.
 Petersen, Helen, Exam. pharm., Frk., Vendersgade 27³, Kbhv. K.
 Petersen, Henning E., Docent, Dr. phil., Nyelandsvej 109, Kbhv. F.
 Petersen, Wm., Fru Mægler, General Bahnsonsvej 13², Kbhv. F.
 Piil, Jens, Direktør, Sortedamsdossering 63 B, Ø.
 Poort, Johs., stud. med., Studentergaarden, Tagensvej 15, Kbhv. N.
 Prior, Sophus, Læge, Skovhuset pr. Græsted.
 Quistgaard, P., Forstassistent, Hegnetslund, Herfølge.
 Rankov, K. A., Fuldmægtig, Torvegade 27⁴, Kbhv. K.
 Rasmussen, Aage, Hovedkasserer, Frederik 6. Allé 4³, Kbhv. F.
 Rasmussen, Cate, Frue, Frederik 6. Allé 4³, Kbhv. F.
 Rasmussen, C. O., Tandlæge, Frederikssund.
 Rasmussen, K., Civilingeniør, Evaldsgade 9, Kbhv. N.
 Reinhardt, A., Enkefrue, Strandgade 5 C, St., Kbhv. K.
 Robertson, H., Foto Studio, Ndr. Fasanvej 80, Kbhv. F.
 Rode, E., Overretssagfører, Vestre Boulevard 29, Kbhv. V.
 Rosen, H. von, Revisor, Niels Juelsgade 11, Kbhv. K.
 Rosen, Else von, Frue, Niels Juelsgade 11, Kbhv. K.
 Rosenkrantz, Helga, Baronesse, Ved Volden 13, Kbhv. K.
 Rosenstand, Finn, Grosserer, Sundvænget 36, Charlottenlund.
 Rosenvinge, C. V., Bankfuldmægtig, H. C. Ørstedesvej 48A, Kbhv. V.

b. Finland.

Hintikka, T. J., Fil. dr., Annank 29, Helsinki.
 Häyrén, Ernst, Fil. dr., Åbovägen 33, Helsingfors.
 Liro, J. Ivar, Professor, Fil. dr., Ritarik 6, Helsinki.
 Nyberg, Wolmar, Bankdirektør, Grankulla.

c. Norge.

Bagge, Fr., Printz, Tollkontrollør, Frydenlundsg. 12, Oslo.
 Bergens Museum, Avdeling for systematisk botanikk, Bergen.
 Bøhme, Chr. Fr., Agent, Framnesvejen 12, Oslo.
 Dybwad, Jacob, Forlags- og Sortimentsbokhandel, Oslo.
 Jørstad, Ivar, Statsmykolog, Dr., Botanisk Museum, Oslo.
 Lunde, Bertel, Kirkesanger, Holm Skole, Torsnes pr. Frederikstad Ø.
 Robak, Haakon, Cand. real., Universitetets botaniske laboratorium,
 Christian IVdes gt. 1, Oslo.
 Soppforening i Bergen, Bergens Museum, Bergen.
 Störmer, Carl, Professor, Dr., Institut for teoretisk Astrofysik,
 Blindern, V. Aker.
 Thomle, J. E., Ekspedisjonschef, Oscarsgatan 78, Oslo.
 Traaen, A. E., Docent, Landbrukshøjskolen, Ås.
 Universitetets botaniske Museum, Oslo.

d. Sverige.

Åberg, Erik, Ingeniör, Ringgatan 12a, Upsala.
 Ahlner, Sten, Fil. lic., Bot. Institutionen, Upsala.
 Andersson, Olof, Amanuens, Botaniska Museet, Lund.
 Arwidsson, Th., Fil. lic., e. o. museiassistent, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
 Blix, Gunnar, Professor, Med. dr., Upsala.
 Botaniska Institutionen, Upsala.
 Bruun, H. G., Fil. lic., Lektor, Strängnäs.
 Cederström, Adolph, Friherre, Upsala.
 Christoffersen, J. H., Fil. kand., Handskmakaregatan 4, Lund.
 Dahlbeck, Nils, Fil. lic., De Geersgatan 10¹, Stockholm.
 Dahlgren, K. V. O., Docent, Upsala.
 Degelius, Gunnar, Docent, Fil. dr., Ö. Slottsgatan 14 A³, Upsala.
 Floderus, Esbjörn, Höglandstorget pr. Stockholm.
 Fries, N. P. E., Docent, Fil. dr., S. Rudbecksgatan 5, Upsala.
 Fries, Rob. E., Professor, Fil. dr., Bergianska Trädgården, Stockholm.
 Fritzes, A. B. C., Kgl. Hovbokhandel, Stockholm.

- Gelin, Olov E. V., Fil. lic., Weibullsholms Växtförädlingsanstalt, Landskrona.
 Gleerupska Univ.-Bokhandeln, Lund.
 Göteborgs Botaniska Trädgård, Göteborg.
 Hagemann, G. A., Hofjægermester, Godsejer, cand. polyt., Bergsjöholm, Ystad.
 Haglund, Erik, Dr., Lahäll, Roslags-Näsby.
 Hammarlund, C., Fil. dr., Statens Växtskyddsanstalt, Stockholm.
 Hasselberg, G. B. E., Fil. dr., Östersund.
 Kungl. Vetenskapsakademiens Bibliotek, Stockholm 50.
 Lindfors, Th., Fil. dr., Statens Växtskyddsanstalt, Stockholm.
 Lundel, Seth, Ringgatan 8 D, Upsala.
 Lundequistska Bokhandeln, Akt. Bol., Upsala.
 Nannfeldt, J. A., Professor, Fil. dr., Upsala.
 Nathorst-Windahl, T., Direktör, Botaniska Trädgården, Göteborg.
 Palm, B. T., Docent, Fil. dr., Bot. Institut, Stockholms Högskola.
 Persson, Per Bränd, Sockenvägen 541, Enskede.
 Rennerfelt, E. G., Fil. dr., Botaniska Trädgården, Göteborg.
 Ridelius, K. G., Fil. mag., Lindesberg.
 Skogsbiblioteket, Experimentalfältet.
 Svedelius, N., Professor, Fil. dr., Kyrkogårdsgatan 5A, Upsala.
 Svensson, Harry, Lektor, Malmtorggatan 3, Karlstad.
 Swärd, Arvid, Intendent, Humlegårdsgatan 22¹, Stockholm.

e. Andre Lande.

- Dodge, C. W., Professor, Dr., Missouri Botanical Garden, St. Louis, Mo., U. S. A.
 Friedländer, R. & Sohn, Buchhandlung, Karlstrasse 11, Berlin.
 Gäumann, E., Professor, Dr., Eidg. Technische Hochschule, Universitätsstrasse 2, Zürich.
 Harvard College, Library, Cambridge, Mass., U. S. A.
 Naturhistorisches Museum, Wien.
 Pennsylvania State College, Agricultural Library, State College, Pa., U. S. A.
 Zundel, G. L., Professor, Plant Pathology Extension, Pennsylvania State College, State College, Pa., U. S. A.

Friesia udkommer i Hefter med tvangfrit Mellemrum. Ny tiltrædende Medlemmer af Foreningen til Svampekundskabens Fremme faar gratis tilstillet, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Aarskontingentet er 3 Kr., for Medlemmer uden for de skandinaviske Lande dog 5 Kr.

Sekretariatets og Redaktionens Adresse er Rolighedsvej 23, København V. Her modtages saavel Ind- og Udmeldelser af Foreningen som Anmeldelser om Flytning. Al Korrespondance vedrørende Tidsskriftet rettes til samme Adresse.

Af det nu afsluttede „Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme“ haves endnu et Restoplag, der kan afgives til en Pris af 5 Kr. pr. Bd. (Bd. I, 1912—15, inkompl.; Bd. II—IV, 1916—30, kompl.)

Friesia is published at irregular intervals.

Subscription price. Danish crowns 3.00 per year the Scandinavian countries. Other countries Danish crowns 5.00 per year.

Address: Copenhagen, Rolighedsvej 23.

Separate Numbers. In Scandinavia separate numbers of vol. I may be obtained at Danish crowns 3.00 per copy and of vol. II at Danish crowns 5.00 per copy. In other countries the corresponding prices are respectively Danish crowns 6.00 and 10.00.

Back Volumes. „Friesia“ is a continuation of the former periodical „Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme“ (Contributions from the society for the advancement of Mycology in Denmark), of which back volumes may be obtained at Danish crowns 5.00 per volume (Vol. I, 1912—15, inkompl.; Vol. II—IV, 1916—30, compl.).

